

TRAITÉ DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS

PCT

NOTIFICATION D'ELECTION

(règle 61.2 du PCT)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

Destinataire:

Assistant Commissioner for Patents
United States Patent and Trademark
Office
Box PCT
Washington, D.C.20231
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

en sa qualité d'office élu

Date d'expédition (jour/mois/année) 30 septembre 1999 (30.09.99)	Demande internationale no PCT/FR99/00196	Référence du dossier du déposant ou du mandataire H50765C38VT
Date du dépôt international (jour/mois/année) 29 janvier 1999 (29.01.99)	Date de priorité (jour/mois/année) 30 janvier 1998 (30.01.98)	
Déposant BENAROUS, Richard etc		

1. L'office désigné est avisé de son élection qui a été faite:

☒ dans la demande d'examen préliminaire international présentée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international le:

10 août 1999 (10.08.99)

☐ dans une déclaration visant une élection ultérieure déposée auprès du Bureau international le:

2. L'élection ☒ a été faite

☐ n'a pas été faite

avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité ou, lorsque la règle 32 s'applique, dans le délai visé à la règle 32.2b).

Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse	Fonctionnaire autorisé R. Forax
no de télécopieur: (41-22) 740.14.35	no de téléphone: (41-22) 338.83.38

CLAIMS

1. Human β TrCP protein (h- β TrCP) for the targeting of proteins towards proteasome degradation pathways, characterized in that it has SEQ ID No. 2.
- 5 2. Protein according to claim 1, characterized in that it is capable of interacting with proteins degradable by proteasome, especially those which possess the phosphorylation unit comprising the amino acids Asp-Ser-Glu-Xaa-Xaa-Ser, in which Xaa is any natural amino acid and the serine residues are phosphorylated.
3. Protein according to claim 1 or 2, characterized in that it is capable of
10 interacting with the Vpu protein of HIV-1 virus or with the cell proteins I κ B or β -catenin.
4. Protein according to claim 1, characterized in that it is capable of interacting with the Skp1p protein.
5. Protein according to claim 1 or 2, characterized in that it comprises the
15 following units:
- F-box: amino acids 147-191,
 - first WD unit: amino acids 259-292,
 - second WD unit: amino acids 304-332,
 - third WD unit: amino acids 343-372,
 - 20 - fourth WD unit: amino acids 387-415,
 - fifth WD unit: amino acids 427-455,
 - sixth WD unit: amino acids 467-492,
 - seventh WD unit: amino acids 516-544.
6. Peptide fragments of the protein according to any one of claims 1 to 5
25 which result from the addition, deletion and/or replacement of one or more amino acids, said peptide fragments having conserved the activity of interacting with the Vpu protein of HIV-1, the cell protein I κ B or the cell protein β -catenin and/or with the Skp1p protein.
7. Nucleic acid sequences coding for the human protein h- β Trcp and the
30 peptide fragments according to any one of claims 1 to 6, characterized in that they consist of:
- a) the DNA sequence SEQ ID No. 1 and the DNA sequences of the nucleic acid fragments coding for said peptide fragments;
 - b) the DNA sequences which hybridize under strict conditions with the above
35 sequences or one of its fragments;

REPLACED BY 11/2/30

- c) the DNA sequences which, due to the degeneracy of the genetic code, result from the sequences a) and b) above and code for the human protein h- β Trcp or fragments thereof; and
- d) the corresponding mRNA and DNA sequences.
- 5 8. Use of the h- β TrCP protein or the peptide fragments according to any one of claims 1 to 6 for the screening of anti-HIV-1 antiviral agents capable of inhibiting the interaction between the h- β TrCP protein and the Vpu protein.
9. Use of the h- β TrCP protein or the peptide fragments according to any one of claims 1 to 6 for the screening of anti-HIV-1 antiviral agents capable of
- 10 10. Use of the nucleic acid sequences according to claim 7 for the screening of anti-HIV antiviral agents capable of inhibiting the interaction between the h- β TrCP protein and the Vpu protein.
11. Use of the nucleic acid sequences according to claim 7 for the screening of
- 15 11. Use of the nucleic acid sequences according to claim 7 for the screening of anti-HIV antiviral agents capable of inhibiting the interaction between the h- β TrCP protein and the Skp1p protein.
12. Use of the h- β TrCP protein or the peptide fragments according to any one of claims 1 to 6 for the screening of antitumoral agents capable of perturbing the regulation of the cell cycle or the protein degradation processes in tumoral human
- 20 12. Use of the h- β TrCP protein or the peptide fragments according to any one of claims 1 to 6 for the screening of antitumoral agents capable of perturbing the regulation of the cell cycle or the protein degradation processes in tumoral human cells by modulating the interaction between the h- β TrCP protein and the Skp1p protein.
13. Use of the nucleic acid sequences according to claim 7 for the screening of antitumoral agents capable of perturbing the regulation of the cell cycle or the protein degradation processes in tumoral human cells by modulating the interaction
- 25 13. Use of the nucleic acid sequences according to claim 7 for the screening of antitumoral agents capable of perturbing the regulation of the cell cycle or the protein degradation processes in tumoral human cells by modulating the interaction between the h- β TrCP protein and the Skp1p protein.
14. Use of the h- β TrCP protein or the peptide fragments according to any one of claims 1 to 6 for the screening of anti-inflammatory agents capable of perturbing activation of the NF κ B transcription factor by inhibiting the interaction between the h- β TrCP protein and the I κ B protein.
- 30 14. Use of the h- β TrCP protein or the peptide fragments according to any one of claims 1 to 6 for the screening of anti-inflammatory agents capable of perturbing activation of the NF κ B transcription factor by inhibiting the interaction between the h- β TrCP protein and the I κ B protein.
15. Use of the nucleic acid sequences according to claim 7 for the screening of anti-inflammatory agents capable of perturbing activation of the NF κ B transcription factor by inhibiting the interaction between the h- β TrCP protein and the I κ B protein.
- 35 15. Use of the nucleic acid sequences according to claim 7 for the screening of anti-inflammatory agents capable of perturbing activation of the NF κ B transcription factor by inhibiting the interaction between the h- β TrCP protein and the I κ B protein.
16. Use of the h- β TrCP protein or the peptide fragments according to any one of claims 1 to 6 for the screening of antitumoral agents capable of reactivating the

interaction between the h- β TrCP protein and a mutated β -catenin protein in tumoral cells, or between h- β TrCP and normal β -catenin in tumoral cells devoid of the APC protein.

17. Use of the nucleic acid sequences according to claim 7 for the screening of antitumoral agents capable of reactivating the interaction between the h- β TrCP protein and the mutated β -catenin protein in tumoral cells, or between h- β TrCP and normal β -catenin in tumoral cells devoid of the APC protein.
18. Use of the h- β TrCP protein or the peptide fragments according to any one of claims 1 to 6 for the screening of anti-Alzheimer agents capable of reducing the degree of degradation of β -catenin by inhibiting the interaction between the h- β TrCP protein and the β -catenin protein.
19. Use of the nucleic acid sequences according to claim 7 for the screening of anti-Alzheimer agents capable of reducing the degree of degradation of β -catenin by inhibiting the interaction between the h- β TrCP protein and the β -catenin protein.
20. Use of the h- β TrCP protein or the peptide fragments according to any one of claims 1 to 6 for the detection of β -catenin mutations by yeast two-hybrid screening.
21. Use of the nucleic acid sequences according to claim 7 for the detection of β -catenin mutations by yeast two-hybrid screening.
22. Anti-HIV antiviral agents which consist of the peptide fragments of the h- β TrCP protein according to claim 4, devoid of the F-box.
23. Anti-HIV antiviral agents which consist of the peptide fragments of the h- β TrCP protein according to claim 7, devoid of the WD units.
24. Antibodies directed against the h- β TrCP protein or the peptide fragments as defined in any one of claims 1 to 6.
25. Antisense oligonucleotides which block the transcription or translation of the h- β TrCP protein according to any one of claims 1 to 6 and which hybridize with a nucleic acid sequence according to claim 7.
26. Antitumoral agents which consist of the peptide fragments of the h- β TrCP protein according to claim 7 and which possess the F-box.
27. Antitumoral agents which consist of the peptide fragments of the h- β TrCP protein according to claim 7 and which have conserved both the WD units and the F-box.
28. Anti-inflammatory agents which consist of the peptide fragments of the h-

β TrCP protein according to claim 7, devoid of the F-box.

29. Transgenic animals which express a transgene for the h- β TrCP protein according to any one of claims 1 to 6.

30. Transgenic animals in which the β TrCP gene has been invalidated.

5 31. Expression vector, characterized in that it comprises a nucleic acid sequence according to claim 7 and the means necessary for its expression.

32. Microorganisms or host cells transformed by an expression vector according to claim 31.

10 33. Microorganisms or host cells cotransformed by an expression vector containing the gene coding for the Vpu protein and by an expression vector according to claim 31.

34. Microorganisms or host cells cotransformed by an expression vector containing the gene coding for the Skp1p protein and by an expression vector according to claim 31.

15 35. Microorganisms or host cells cotransformed by an expression vector containing the gene coding for the I κ B protein and by an expression vector according to claim 31.

20 36. Microorganisms or host cells cotransformed by an expression vector containing the gene coding for the oncogenic β -catenin protein and by an expression vector according to claim 31.

PCT

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire H50765C38VT	POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport de recherche internationale (formulaire PCT/ISA/220) et, le cas échéant, le point 5 ci-après	
Demande internationale n° PCT/FR 99/ 00196	Date du dépôt international (jour/mois/année) 29/01/1999	(Date de priorité (la plus ancienne) (jour/mois/année) 30/01/1998
Déposant INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA R. ..et al.		

Le présent rapport de recherche internationale, établi par l'administration chargée de la recherche internationale, est transmis au déposant conformément à l'article 18. Une copie en est transmise au Bureau international.

Ce rapport de recherche internationale comprend 4 feuilles.

☒ Il est aussi accompagné d'une copie de chaque document relatif à l'état de la technique qui y est cité.

1. Base du rapport

a. En ce qui concerne la **langue**, la recherche internationale a été effectuée sur la base de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée, sauf indication contraire donnée sous le même point.

☐ la recherche internationale a été effectuée sur la base d'une traduction de la demande internationale remise à l'administration.

b. En ce qui concerne les **séquences de nucléotides ou d'acides aminés** divulguées dans la demande internationale (le cas échéant), la recherche internationale a été effectuée sur la base du listage des séquences :

☒ contenu dans la demande internationale, sous forme écrite.

☒ déposée avec la demande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur.

☐ remis ultérieurement à l'administration, sous forme écrite.

☐ remis ultérieurement à l'administration, sous forme déchiffrable par ordinateur.

☒ La déclaration, selon laquelle le listage des séquences présenté par écrit et fourni ultérieurement ne vas pas au-delà de la divulgation faite dans la demande telle que déposée, a été fournie.

☒ La déclaration, selon laquelle les informations enregistrées sous forme déchiffrable par ordinateur sont identiques à celles du listage des séquences présenté par écrit, a été fournie.

2. ☐ Il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche (voir le cadre I).

3. ☐ Il y a absence d'unité de l'invention (voir le cadre II).

4. En ce qui concerne le **titre**,

☐ le texte est approuvé tel qu'il a été remis par le déposant.

☒ Le texte a été établi par l'administration et a la teneur suivante:

PROTEINE HUMAINE BTRCP

5. En ce qui concerne l'**abrégé**,

☒ le texte est approuvé tel qu'il a été remis par le déposant

☐ le texte (reproduit dans le cadre III) a été établi par l'administration conformément à la règle 38.2b). Le déposant peut présenter des observations à l'administration dans un délai d'un mois à compter de la date d'expédition du présent rapport de recherche internationale.

6. La figure des **dessins** à publier avec l'abrégé est la Figure n°

☐ suggérée par le déposant.

☐ parce que le déposant n'a pas suggéré de figure.

☐ parce que cette figure caractérise mieux l'invention.

☐ Aucune des figures n'est à publier.

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No

CT/FR 99/00196

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE

CIB 6 C12N15/12 C07K14/47 C12N15/85 C07K16/18 A61K38/17
A01K67/027

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 6 C07K

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	WO 95 21252 A (UNIV LELAND STANFORD JUNIOR) 10 août 1995 voir page 1 - page 5 voir page 19 - page 27 voir page 80 - page 82	1-7
Y	---	8-36
X	HUDSON J.W. ET AL.: "Beta-transducin repeat containing protein-3" EMBL SEQUENCE DATABASE, 1 février 1997, XP002082116 HEIDELBERG DE Accession Nr.: P70038 voir abrégé ---	6,7
	-/--	

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

° Catégories spéciales de documents cités:

- "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- "T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- "&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

21 mai 1999

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

07/06/1999

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

De Kok, A

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No

CT/FR 99/00196

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Y	MARGOTTIN F ET AL.: "Interaction between the cytoplasmic domains of HIV-1 Vpu and CD4: Role of Vpu residues involved in CD4 interaction and in vitro CD4 degradation" VIROLOGY., vol. 223, 1996, pages 381-386, XP002082117 RLANDO US cité dans la demande voir abrégé	8-13, 20, 22-26, 29-34
A	--- DATABASE WPI Section Ch, Week 9629 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class B04, AN 96-283507 XP002082120 & JP 08 119996 A (JAPAN TOBACCO INC) , 14 mai 1996 voir abrégé	1, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 26, 31, 32
A	--- BAI C ET AL.: "SKP1 connects cell cycle regulators to the ubiquitin proteolysis machinery through a novel motif, the F-box" CELL, vol. 86, no. 2, 26 juillet 1996, pages 263-274, XP002082118 NA US voir abrégé voir page 267; figure 4B	3-6, 9, 11, 22, 26
A	--- NEER E.J. ET AL.: "The ancient regulatory-protein family of WD-repeat proteins" NATURE., vol. 371, 22 septembre 1994, pages 297-300, XP002082119 LONDON GB voir le document en entier	1-7
A	--- EP 0 342 860 A (DANA FARBER CANCER INST INC) 23 novembre 1989 voir le document en entier	34
P, X	--- PATTON E E ET AL: "Combinatorial control in ubiquitin-dependent proteolysis: don't Skp the F-box hypothesis" TRENDS IN GENETICS, vol. 14, no. 6, juin 1998, page 236-243 XP004121083 voir page 241, colonne 1, dernier alinéa voir page 242, colonne 1, alinéa 1 ---	1-13, 22-26, 29-34

-/--

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

CT/FR 99/00196

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
P,X	<p>MARGOTTIN F ET AL: "A novel human WD protein, h-beta TrCP, that interacts with HIV-1 Vpu connects CD4 to the ER degradation pathway through an F-box motif"</p> <p>MOLECULAR CELL, vol. 1, no. 4, mars 1998, pages 565-574, XP002101956 CAMBRIDGE US voir le document en entier</p> <p style="text-align: center;">---</p>	<p>1-13, 22-26, 29-34</p>
P,Y	<p>YARON A ET AL.: "Identification of the receptor component of the IkappaBalpha-ubiquitin ligase"</p> <p>NATURE., vol. 396, no. 6711, 10 décembre 1998, pages 590-594, XP002101957 LONDON GB voir abrégé</p> <p style="text-align: center;">---</p>	<p>3,6,14, 15,28,35</p>
P,Y	<p>LATRES E ET AL: "The human F box protein beta-TrCP associates with the Cull1/Skp1 complex and regulates the stability of beta-catenin"</p> <p>ONCOGENE, vol. 18, no. 4, 28 janvier 1999, pages 849-854, XP002101958 voir abrégé</p> <p style="text-align: center;">---</p>	<p>3,6, 16-21, 27,36</p>
P,A	<p>SKOWYRA D ET AL.: "The SCF ubiquitin ligase in cell cycle control and beyond"</p> <p>MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL, vol. 9, no. suppl., novembre 1998, page 240A XP002101959 voir abrégé</p> <p style="text-align: center;">-----</p>	<p>2</p>

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande Internationale No

T/FR 99/00196

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 9521252 A	10-08-1995	US 5519003 A	21-05-1996
		AU 1910095 A	21-08-1995
		CA 2182299 A	10-08-1995
		EP 0742824 A	20-11-1996
		JP 9511390 T	18-11-1997
		US 5783405 A	21-07-1998
		US 5776716 A	07-07-1998
EP 0342860 A	23-11-1989	US 5043262 A	27-08-1991
		AU 633821 B	11-02-1993
		AU 3460289 A	16-11-1989
		JP 2138978 A	28-05-1990
		OA 9116 A	31-10-1991
		US 5288640 A	22-02-1994

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

Expéditeur: L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE
L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Destinataire:

GILLARD, Marie-Louise
Cabinet BEAU DE LOMENIE
158, rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07
FRANCE

23 JAN 2000

PCT

NOTIFICATION DE TRANSMISSION DU
RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE
INTERNATIONAL
(règle 71.1 du PCT)

Date d'expédition
(jour/mois/année)

23.06.00

Référence du dossier du déposant ou du mandataire
H50765C38VT

NOTIFICATION IMPORTANTE

Demande internationale No.
PCT/FR99/00196

Date du dépôt international (jour/mois/année)
29/01/1999

Date de priorité (jour/mois/année)
30/01/1998

Déposant

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA R. ...et al.

1. Il est notifié au déposant que l'administration chargée de l'examen préliminaire international a établi le rapport d'examen préliminaire international pour la demande internationale et le lui transmet ci-joint, accompagné, le cas échéant, de ces annexes.
2. Une copie du présent rapport et, le cas échéant, de ses annexes est transmise au Bureau international pour communication à tous les offices élus.
3. Si tel ou tel office élu l'exige, le Bureau international établira une traduction en langue anglaise du rapport (à l'exclusion des annexes de celui-ci) et la transmettra aux offices intéressés.

4. RAPPEL

Pour aborder la phase nationale auprès de chaque office élu, le déposant doit accomplir certains actes (dépôt de traduction et paiement des taxes nationales) dans le délai de 30 mois à compter de la date de priorité (ou plus tard pour ce qui concerne certains offices) (article 39.1) (voir aussi le rappel envoyé par le Bureau international dans le formulaire PCT/IB/301).

Lorsqu'une traduction de la demande internationale doit être remise à un office élu, elle doit comporter la traduction de toute annexe du rapport d'examen préliminaire international. Il appartient au déposant d'établir la traduction en question et de la remettre directement à chaque office élu intéressé.

Pour plus de précisions en ce qui concerne les délais applicables et les exigences des offices élus, voir le Volume II du Guide du déposant du PCT.

Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen
préliminaire international



Office européen des brevets
D-80298 Munich
Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Fonctionnaire autorisé

Gazzoli, M

Tél. +49 89 2399-2815



TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)



Référence du dossier du déposant ou du mandataire H50765C38VT	POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)	
Demande internationale n° PCT/FR99/00196	Date du dépôt international (jour/mois/année) 29/01/1999	Date de priorité (jour/mois/année) 30/01/1998
Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB C12N15/12		
Déposant INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA R. ..et al.		

1. Le présent rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est transmis au déposant conformément à l'article 36.
2. Ce RAPPORT comprend 7 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.
 - ☒ Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).

Ces annexes comprennent 5 feuilles.

3. Le présent rapport contient des indications relatives aux points suivants:

- I ☒ Base du rapport
- II ☐ Priorité
- III ☐ Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle
- IV ☐ Absence d'unité de l'invention
- V ☒ Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- VI ☒ Certains documents cités
- VII ☐ Irrégularités dans la demande internationale
- VIII ☒ Observations relatives à la demande internationale

Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale 10/08/1999	Date d'achèvement du présent rapport 23.08.00
Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international:  Office européen des brevets D-80298 Munich Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Fonctionnaire autorisé Chavanne, F N° de téléphone +49 89 2399 8399 

**RAPPORT D'EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n° PCT/FR99/00196

I. Base du rapport

1. Ce rapport a été rédigé sur la base des éléments ci-après (*les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans le présent rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications.*) :

Description, pages:

1-37 version initiale

Revendications, N°:

1-36 reçue(s) avec télécopie du 26/04/2000

Dessins, feuilles:

1/12-12/12 version initiale

2. Les modifications ont entraîné l'annulation :

- ☐ de la description, pages :
- ☐ des revendications, n°s :
- ☐ des dessins, feuilles :

3. ☐ Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle 70.2(c)) :

4. Observations complémentaires, le cas échéant :

**RAPPORT D'EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n° PCT/FR99/00196

V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté	Oui : Revendications 1-36
	Non : Revendications
Activité inventive	Oui : Revendications
	Non : Revendications 1-36
Possibilité d'application industrielle	Oui : Revendications 1-36
	Non : Revendications

2. Citations et explications

voir feuille séparée

VI. Certain documents cités

1. Certains documents publiés (règle 70.10)

et / ou

2. Divulgations non écrites (règle 70.9)

voir feuille séparée

VIII. Observations relatives à la demande internationale

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarté des revendications, de la description et des dessins et de la question de savoir si les revendications se fondent entièrement sur la description :

voir feuille séparée

V. Déclaration motivée selon la règle 66.2(a)(ii) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. L'examen de la présente demande a été réalisé en assumant que la priorité revendiquée est valide. S'il devait se révéler que tel n'est pas le cas, des documents intermédiaires deviendraient alors pertinent pour juger de la brevetabilité de l'objet de la présente demande.

2. Il est fait référence aux documents suivants:

D1: Nature

Vol. 391, page 493-496, 1998

D2: Cell

Vol. 86, pages 263-274, 1996

3. L'objet des revendications 1-36 n'est pas décrit de manière spécifique dans l'art antérieur. Par conséquent, ces revendications peuvent être considérées comme nouvelles.

4. Le document D1 est considéré comme l'état de la technique le plus proche des revendications 1-3, 5-7, 29-32 et 36.

Le problème technique que se propose de résoudre la présente demande peut être énoncé comme étant de mettre à disposition un moyen de modulation du ciblage des protéines vers le protéasome. La présente demande se propose de résoudre le problème posé par la mise à disposition de la protéine humaine de β TrCP.

Le document D1 diffère de l'objet des revendications 1-3, 5-7, 31, 32 et 36 en ce que l'implication de l'équivalent humain de la Slimb, protéine β TrCP de la drosophile, dans la dégradation protéolytique de la β -caténine, n'est que suggérée dans D1 (page 496, paragraphe 2). De plus, il est connu dans l'état de la technique que la protéine de type β TrCP de la drosophile, la protéine Slimb, et la protéine β TrCP de Xenope ont une très haute homologie, ce qui soutient la conservation de la fonction chez ces protéines homologues (voir notamment description page 1, ligne 23 à page 2, ligne 13; D1, page 496, paragraphe 2).

D1 mentionne également la possible implication de la protéine β TrCP dans la suppression tumorale (page 496, paragraphe 2).

En prenant en compte le problème à résoudre, l'homme du métier, au vu de D1, testerait l'implication de la protéine humaine β TrCP dans le ciblage de la β -caténine vers le protéasome. L'isolation de la protéine β TrCP humaine ne nécessite la mise en oeuvre d'aucune activité inventive. Du fait de la très haute conservation de séquence de la protéine β TrCP entre les différentes espèces, par la mise en oeuvre des techniques connues d'hybridation notamment, l'homme du métier isolerait automatiquement un clone d'ADNc codant pour la β TrCP humaine de SEQ ID NO:2. Par la simple application de techniques couramment utilisées, l'homme du métier arriverait donc sans nécessiter la mise en oeuvre d'activité inventive à l'objet des revendications 1-3, 5-7, 29-32 et 36. Dans ce contexte, il est à noter que la référence à des protéines introduite par l'expression "notamment" (revendication 2) est introduite à titre d'exemple indicatif et en aucun cas exhaustif, et ne peut donc être considéré comme limitant l'objet de la revendication concernée. Les revendications 1-3, 5-7, 29-32 et 36 ne sont donc pas inventives.

L'activité de la β -caténine, l'action de son accumulation dans les cellules ou de la diminution de son niveau dans les cellules neuronales, notamment, son connues dans l'état de la technique (voir notamment description, page 5, lignes 3-24). Par l'application plus en avant de ses connaissances et la mise en oeuvre de techniques couramment utilisées, l'homme du métier arriverait également à l'objet des revendications 16-21 et 24-27. Ces revendications ne sont donc pas inventives.

Le document D2 peut être considéré comme l'état de la technique le plus proche des revendications 4, 6, 24 et 34. D2 se différencie de l'objet de ces revendications par le fait que l'interaction de la β TrCP avec la protéine Skp1p n'y est que suggérée.

D2 montre que la protéine Skp1p est nécessaire pour la protéolyse médiée par l'ubiquitine. Le motif Boîte F, présent dans la protéine β TrCP, est indispensable pour l'interaction avec Skp1p et le ciblage des protéines vers le protéasome (voir notamment résumé; figure 4A et 4B). De plus, D2 montre l'activité de la Skp1p au niveau du contrôle du cycle cellulaire, mettant en évidence son action dans la prolifération cellulaire (page 266, colonne 2; page 271, colonne 2 à page 272, colonne 1).

Par conséquent, au vu de D2, et en le combinant avec D1, l'homme du métier arriverait à l'objet des revendications 4, 6, 22, 24 et 34. De plus, de part la relation mise en évidence dans D2 de l'activité de la protéine Skp1p au niveau du contrôle du cycle cellulaire, l'homme du métier, par la simple mise en application de ses connaissances arriverait également à l'objet des revendications 9, 11-13 et 25-27. Les revendications 4, 6, 9, 11-13, 22, 24-27 et 34 ne sont donc pas inventives. La dépendance de la protéine Vpu de la présence d'une machinerie d'ubiquitination intacte pour sa médiation de la dégradation du récepteur CD4, ainsi que l'activité de la protéine I κ B comme inhibiteur du facteur de transcription NF κ B et son ciblage vers les voies de dégradation du protéasome sont connus dans l'état de la technique (voir notamment, description, page 3; page 4, lignes 23-30). Par conséquent, au vu des enseignements précédemment cités et des relations connues dans l'état de la technique entre protéines Vpu et I κ B et protéasome, il aurait été évident pour l'homme du métier de tester l'interaction de la protéine humaine β TrCP avec également la protéine Vpu et la protéine I κ B, et ainsi de parvenir à l'objet des revendications 8, 10, 14, 15, 22, 23, 28, 33 et 35. Ces revendications ne sont donc pas inventives. Par conséquent, les revendications 1-36 ne remplissent pas les conditions de l'Article 33(3) PCT.

VI. Certains documents cités

Certains documents publiés (règle 70.10)

1. Trends in Genetics
Vol. 14, No. 6, pp. 236-243, 1998
2. Molecular Cell
Vol. 1, No. 4, pp. 565-574, 1998
3. Nature
Vol. 396, No. 6711, pp. 590-594, 1998
4. Oncogene
Vol. 18, No. 4, pp. 849-854, 1999
5. Molecular Biology of the Cell
Vol. 9, No. suppl., page 240A, 1998

VIII. Observations relatives à la demande internationale

1. L'objet des revendications 2-4 pour lequel protection est recherchée (une protéine) n'est pas clairement défini, du fait que celui-ci n'est pas défini par des caractéristiques techniques. En effet, ces revendications sont énoncées de telle manière que leur objet n'est défini que par le résultat à obtenir ("est capable de..."). Une telle définition n'est admissible que dans les conditions prévues par les Directives C-III, 4.7 PCT. Les formulations ici utilisées ne sont cependant pas acceptables parce qu'il est possible de définir l'objet revendiqué dans des termes plus concrets, c'est à dire par la manière dont le résultat peut être atteint. Les revendications 2-4 ne remplissent donc pas les conditions de l'Article 6 PCT.
2. L'étendue des revendications 32-36 inclue un hôte humain et devrait donc être limitée en conséquence.

REVENDICATIONS

1. Protéine humaine β TrCP (h- β TrCP) de ciblage des protéines vers les voies de dégradation par le protéasome, caractérisée en ce qu'elle a la
5 SEQ ID No.2.
2. Protéine selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle possède des motifs WD et en ce qu'elle est capable d'interagir avec les protéines susceptibles d'être dégradées par le protéasome, notamment celles qui possèdent le motif de phosphorylation comprenant les acides aminés Asp-Ser-Glu-Xaa-Xaa-Ser dans
10 lequel Xaa est un acide aminé naturel quelconque et dans lequel les résidus sérine sont phosphorylés.
3. Protéine selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce qu'elle possède des motifs WD et en ce qu'elle est capable d'interagir avec la protéine Vpu du virus HIV-1 ou avec les protéines cellulaires I κ B ou β -caténine.
- 15 4. Protéine selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle possède une boîte F et en ce qu'elle est capable d'interagir avec la protéine Skp1p.
5. Protéine selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce qu'elle comporte les motifs ci-après :
 - boîte F : acides aminés 147-191,
 - 20 - premier motif WD : acides aminés 259-292,
 - deuxième motif WD : acides aminés 304-332,
 - troisième motif WD : acides aminés 343-372,
 - quatrième motif WD : acides aminés 387-415,
 - cinquième motif WD : acides aminés 427-455,
 - 25 - sixième motif WD : acides aminés 467-492,
 - septième motif WD : acides aminés 516-544.
- 30 6. Fragments peptidiques de la protéine selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 résultant de l'addition, la suppression et/ou le remplacement d'un ou plusieurs acides aminés, lesdits fragments peptidiques ayant conservé l'activité d'interaction avec la protéine Vpu du virus HIV-1, la protéine cellulaire I κ B ou la protéine cellulaire β -caténine et/ou avec la protéine Skp1p.

26-04-2000

FR 009900196

7. Séquences d'acides nucléiques codant pour la protéine humaine h- β TrCP et les fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisées en ce qu'elles sont constituées par :

- a) la séquence d'ADN SEQ ID No.1 et des fragments d'acides nucléiques codant pour lesdits fragments peptidiques ;
- b) les séquences d'ADN hybridant dans des conditions strictes avec les séquences ci-dessus ou un de ses fragments ;
- c) les séquences d'ADN qui, en raison de la dégénérescence du code génétique, résultent des séquences a) et b) ci-dessus et codent pour la protéine humaine h- β TrCP ou les fragments de celle-ci ; et
- d) les séquences d'ARNm et d'ADN correspondantes.

8. Utilisation de la protéine h- β TrCP ou des fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour le criblage d'agents antiviraux anti-HIV-1 susceptibles d'inhiber l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine Vpu.

9. Utilisation de la protéine h- β TrCP ou des fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour le criblage d'agents antiviraux anti-HIV-1 susceptibles d'inhiber l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine Skp1p.

10. Utilisation des séquences d'acides nucléiques selon la revendication 7 pour le criblage d'agents antiviraux anti-HIV susceptibles d'inhiber l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine Vpu.

11. Utilisation des séquences d'acides nucléiques selon la revendication 7 pour le criblage d'agents antiviraux anti-HIV susceptibles d'inhiber l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine Skp1p.

12. Utilisation de la protéine h- β TrCP ou des fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour le criblage d'agents antitumoraux capables de perturber la régulation du cycle cellulaire ou des processus de dégradation des protéines dans des cellules humaines tumorales par modulation de l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine Skp1p.

26-04-2000

FR 009900196

13. Utilisation des séquences d'acides nucléiques selon la revendication 7, pour le criblage d'agents antitumoraux capables de perturber la régulation du cycle cellulaire ou des processus de dégradation des protéines dans des cellules humaines tumorales par modulation de l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine Skp1p.

14. Utilisation de la protéine h- β TrCP ou des fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour le criblage d'agents anti-inflammatoires capables de perturber l'activation du facteur de transcription NF κ B par inhibition de l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine I κ B.

15. Utilisation des séquences d'acides nucléiques selon la revendication 7 pour le criblage d'agents anti-inflammatoires capables de perturber l'activation du facteur de transcription NF κ B par inhibition de l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine I κ B.

16. Utilisation de la protéine h- β TrCP ou des fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour le criblage d'agents antitumoraux susceptibles de réactiver l'interaction entre la protéine h- β TrCP et une protéine β -caténine mutée de cellules tumorales, ou entre la h- β TrCP et la β -caténine normale de cellules tumorales dépourvues de la protéine APC.

17. Utilisation des séquences d'acides nucléiques selon la revendication 7 pour le criblage d'agents antitumoraux susceptibles de réactiver l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine β -caténine mutée de cellules tumorales ou entre la h- β TrCP et la β -caténine normale de cellules tumorales dépourvues de la protéine APC.

18. Utilisation de la protéine h- β TrCP ou des fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour le criblage d'agents anti-Alzheimer susceptibles de réduire le taux de dégradation de la β -caténine par inhibition de l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine β -caténine.

19. Utilisation des séquences d'acides nucléiques selon la revendication 7 pour le criblage d'agents anti-Alzheimer susceptibles de réduire le taux de

dégradation de la β -caténine par inhibition de l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine β -caténine.

20. Utilisation de la protéine h- β TrCP ou des fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour la détection par criblage en double-
5 hybride en levure des mutations de la β -caténine.

21. Utilisation des séquences d'acides nucléiques selon la revendication 7 pour la détection par criblage en double-hybride en levure des mutations de la β -caténine.

22. Agents antiviraux anti-HIV qui sont constitués par les fragments
10 peptidiques de la protéine h- β TrCP selon la revendication 4 dénués de la boîte F.

23. Agents antiviraux anti-HIV qui sont constitués par les fragments peptidiques de la protéine h- β TrCP selon la revendication 7 dénués des motifs WD.

24. Anticorps dirigés contre la protéine h- β TrCP ou les fragments
15 peptidiques tels que définis dans l'une quelconque des revendications 1 à 6.

25. Oligonucléotides antisens bloquant la transcription ou la traduction de la protéine h- β TrCP selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 qui s'hybrident avec une séquence d'acides nucléiques selon la revendication 7.

26. Agents antitumoraux qui sont constitués par les fragments peptidiques
20 de la protéine h- β TrCP selon la revendication 7, qui possèdent la boîte F.

27. Agents antitumoraux qui sont constitués par les fragments peptidiques de la protéine h- β TrCP selon la revendication 7 et qui ont conservé à la fois les motifs WD et la boîte F.

28. Agents anti-inflammatoires qui sont constitués par les fragments
25 peptidiques de la protéine h- β TrCP selon la revendication 7 dénués de la boîte F.

29. Souris transgéniques exprimant un transgène de la protéine h- β TrCP selon l'une quelconque des revendications 1 à 6.

30. Souris transgéniques dans lesquels le gène β TrCP a été invalidé.

26-04-2000

FR 009900196

31. Vecteur d'expression, caractérisé en ce qu'il comprend une séquence d'acides nucléiques selon la revendication 7 et les moyens nécessaires à son expression.

5 32. Microorganismes ou cellules hôtes transformés par un vecteur d'expression selon la revendication 31.

33. Microorganismes ou cellules hôtes co-transformés par un vecteur d'expression contenant le gène codant pour la protéine Vpu et un vecteur d'expression selon la revendication 31.

10 34. Microorganismes ou cellules hôtes cotransformés par un vecteur d'expression contenant le gène codant pour la protéine Skp1p et un vecteur d'expression selon la revendication 31.

35. Microorganismes ou cellules hôtes cotransformés par un vecteur d'expression contenant le gène codant pour la protéine I κ B et un vecteur d'expression selon la revendication 31.

15 36. Microorganismes ou cellules hôtes cotransformés par un vecteur d'expression contenant le gène codant pour la protéine β -caténine oncogène et un vecteur d'expression selon la revendication 31.

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Translation
16C1
09601168
1648RECEIVED
FEB 03 2000
TECH CENTER 1600-2200

Applicant's or agent's file reference H50765C38VT		FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/FR99/00196	International filing date (day/month/year) 29 January 1999 (29.01.99)	Priority date (day/month/year) 30 January 1998 (30.01.98)	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C12N 15/12			
Applicant INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE			

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 7 sheets, including this cover sheet.

☒ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of 5 sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☒ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☒ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 10 August 1999 (10.08.99)	Date of completion of this report 23 June 2000 (23.06.2000)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/FR99/00196

I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of *(Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)*:

- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1-37, as originally filed,
 pages _____, filed with the demand,
 pages _____, filed with the letter of _____,
 pages _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the claims, Nos. _____, as originally filed,
 Nos. _____, as amended under Article 19,
 Nos. _____, filed with the demand,
 Nos. 1-36, filed with the letter of 26 April 2000 (26.04.2000),
 Nos. _____, filed with the letter of _____.
- ☒ the drawings, sheets/fig 1/12-12/12, as originally filed,
 sheets/fig _____, filed with the demand,
 sheets/fig _____, filed with the letter of _____,
 sheets/fig _____, filed with the letter of _____.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/FR 99/00196

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-36	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-36	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-36	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

1. The present application was examined on the assumption that the claimed priority is valid. Should this prove not to be the case, intermediate documents would become relevant for assessing the patentability of the subject matter of the present application.

2. Reference is made to the following documents:

D1: Nature
Vol. 391, pages 493-496, 1998
D2: Cell
Vol. 86, pages 263-274, 1996

3. The subject matter of claims 1-36 is not specifically described in the prior art. Therefore, these claims can be considered novel.

4. Document D1 is considered the prior art closest to claims 1-3, 5-7, 29-32 and 36.

The technical problem addressed by the present application can be considered that of providing means for modulating the targeting of proteins toward the proteasome. The present application aims

to solve the stated problem by making the human protein β TrCP available.

Document D1 differs from the subject matter of claims 1-3, 5-7, 31, 32 and 36 in that the involvement of the human equivalent of Slimb, the β TrCP protein of fruit flies, in the proteolytic degradation of β -catenin, is merely suggested in D1 (page 496, paragraph 2). Moreover, it is known from the prior art that the β TrCP type protein of the fruit fly, the Slimb protein and the β TrCP Xenopus protein are highly homologous, which supports the retention of the function by these homologous proteins (see particularly the description page 1, line 23 to page 2, line 13; D1, page 496, paragraph 2).

D1 also mentions the possible involvement of the β TrCP protein in suppressing tumors (page 496, paragraph 2).

Taking into account the problem to be solved, a person skilled in the art, in light of D1, would test the involvement of the human β TrCP protein in the targeting of β -catenin towards the proteasome. Isolating the human β TrCP protein does not involve an inventive step. Due to the extremely high retention of the β TrCP protein sequence between different species, by implementing known techniques, particularly hybridization, a person skilled in the art would automatically isolate a cDNA clone coding for the human β TrCP protein of SEQ ID NO: 2. By simply applying commonly used techniques, a person skilled in the art would therefore arrive at claims 1-3, 5-7, 29-32 and 36 without exercising an inventive step. In this context, it is worth noting that the reference to proteins introduced by the expression "particularly" (claim 2) constitutes an

indicative example that is in no way exhaustive and therefore cannot be considered to limit the subject matter of the claim in question. Claims 1-3, 5-7, 29-32 and 36 therefore do not involve an inventive step.

The β -catenin activity, the effect of its accumulation in cells or the decrease of its level in the neural cells, particularly, are known from the prior art (see particularly the description, page 5, lines 3-24). By further applying this knowledge and by implementing commonly used techniques, a person skilled in the art would also arrive at the subject matter of claims 16-21 and 24-27. These claims are therefore not inventive.

Document D2 can be considered the prior art closest to claims 4, 6, 24 and 34. D2 differs from the subject matter of these claims in that the interaction of the β TrCP protein with the Skplp protein is merely suggested.

D2 shows that the Skplp protein is necessary for ubiquitin-mediated proteolysis. The F box motif, present in the β TrCP protein, is necessary for the interaction with Skplp and the targeting of proteins toward the proteasome (see particularly summary, figure 4A and 4B). Moreover, D2 discloses the activity of the Skplp in cell cycle control, showing its role in cell proliferation (page 266, column 2; page 271, column 2 to page 272, column 1).

Therefore, in light of D2 and in combination with D1, a person skilled in the art would arrive at claims 4, 6, 22, 24 and 34. Moreover, due to the activity of the Skplp protein in cell cycle control, as shown in D2, a person skilled in the art would also arrive at claims 9, 11-13 and 25-27 by simply applying his/her knowledge. Claims 4, 6, 9, 11-13,

22, 24-27 and 34 therefore are not inventive.

The dependence of the Vpu protein on the presence of intact ubiquitination machinery for its mediation of CD4 receptor degradation, as well as the activity of the I κ B protein as an NF κ B transcription factor inhibitor and targeting thereof towards the proteasome degradation pathway are known from the prior art (see particularly the description, page 3; page 4, lines 23-30). Therefore, in light of the teachings cited above and the relationships between Vpu and I κ B proteins and proteasome known from the prior art, it would have been obvious for a person skilled in the art to test the interaction between the human β TrCP protein and Vpu and I κ B proteins, thereby arriving at the subject matter of claims 8, 10, 14, 15, 22, 23, 28, 33 and 35. These claims therefore are not inventive.

It follows that, claims 1-36 do not meet the requirements of PCT Article 33(3).

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/FR 99/00196

Supplemental Box

(To be used when the space in any of Boxes I to VIII is not sufficient)

Continuation of Box [No.]: VI

Certain published documents (Rule 70.10)

1. Trends in Genetics
Vol. 14, No. 6, pages 236-243, 1998
2. Molecular Cell
Vol. 1, No. 4, pages 565-574, 1998
3. Nature
Vol. 396, No. 6711, pages 590-594, 1998
4. Oncogene
Vol. 18, No. 4, pages 849-854, 1999
5. Molecular Biology of the Cell
vol. 9, No. suppl., page 240A, 1998

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/FR 99/00196

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

1. The subject matter of claims 2-4 for which protection is sought (a protein) is not clearly defined, since it is not defined by technical features. Indeed, these claims are worded in such a way that their subject matter is only defined by the result to be achieved ("is able to..."). Such a definition is only acceptable according to the conditions of the PCT Guidelines C-III, 4.7. The wording used here, however, is not acceptable because it is possible to define the claimed subject matter in more concrete terms, that is, by the way in which the result can be achieved. Claims 2-4 therefore do not meet the requirements of PCT Article 6.
2. The scope of claims 32-36 includes a human host and should therefore be restricted accordingly.

PCT

Réserve à l'office récepteur

REQUETE

Le soussigné requiert que la présente demande internationale soit traitée conformément au Traité de coopération en matière de brevets.

Demande internationale n°

Date du dépôt international

Nom de l'office récepteur et "Demande internationale PCT"

Référence du dossier du déposant ou du mandataire (facultatif)
(12 caractères au maximum) H50765C38VT

Cadre n° I TITRE DE L'INVENTION : Protéine humaine β TrCP de ciblage des protéines vers les voies de dégradation par le protéasome.

Cadre n° II DEPOSANT

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Etat où le déposant a son domicile si aucun domicile n'est indiqué ci-dessous.)

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA
RECHERCHE MEDICALE
101 rue de Tolbiac
75654 PARIS CEDEX 13
France

☐ Cette personne est aussi inventeur

n° de téléphone

n° de télécopieur

n° de téléimprimeur

Nationalité (nom de l'état) : FRANCE

Domicile de l'état (nom de l'état) : FRANCE

Cette personne est déposant pour : ☐ tous les Etats désignés ☒ tous les Etats désignés sauf les Etats-Unis d'Amérique ☐ Les Etats-Unis d'Amérique seulement ☐ les Etats indiqués dans le cadre supplémentaire

Cadre n° III AUTRE(S) DEPOSANT(S) ou (AUTRE(S)) INVENTEUR(S)

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Etat où le déposant a son domicile si aucun domicile n'est indiqué ci-dessous.)

INSTITUT PASTEUR
28 rue du Docteur Roux
75015 PARIS
France

Cette personne est :

☒ déposant seulement
☐ déposant et inventeur
☐ inventeur seulement
Si cette case est cochée, ne pas remplir la suite.)

Nationalité (nom de l'état) : FRANCE

Domicile de l'état (nom de l'état) : FRANCE

Cette personne est déposant pour : ☐ tous les Etats désignés ☒ tous les Etats désignés sauf les Etats-Unis d'Amérique ☐ Les Etats-Unis d'Amérique seulement ☐ les Etats indiqués dans le cadre supplémentaire

☒ D'autres déposants ou inventeurs sont indiqués sur une feuille annexe.

Cadre n° IV MANDATAIRE OU REPRESENTANT COMMUN; OU ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE

La personne dont l'identité est donnée ci-dessous est/a été désignée pour agir au nom ☒ mandataire ☐ représentant commun du ou des déposants auprès des autorités internationales compétente, comme:

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.)

GILLARD Marie-Louise et/ou NEVANT Marc et/ou PORTAL Gérard et/ou
HUBERT Philippe et/ou LE ROUX Martine

du CABINET BEAU DE LOMENIE
158, rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07 - FRANCE

n° de téléphone.
(33) 01 44 18 89 00

n° de télécopieur
(33) 01 44 18 04 23

n° de téléimprimeur

☐ Adresse pour la correspondance : cocher cette case lorsque aucun mandataire ni représentant commun n'est/n'a été désigné et que l'espace ci-dessus est utilisé pour indiquer une adresse spéciale à laquelle la correspondance doit être envoyée.

Suite du cadre n° III AUTRES DEPOSANTS OU (AUTRES) INVENTEURS

Si aucun des sous-cadres suivants ne sont utilisés, la présente feuille ne doit pas être incluse dans la requête

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Etat où le déposant a son domicile si aucun domicile n'est indiqué ci-dessous.)

BENAROUS Richard
19 rue Croulebarbe
75013 PARIS
France

Cette personne est :

- ☐ déposant seulement
☒ déposant et inventeur
☐ inventeur seulement
Si cette case est cochée, ne pas remplir la suite.)

Nationalité (nom de l'état) : FRANCE

Domicile de l'état (nom de l'état) : FRANCE

Cette personne est
déposant pour :

☐

tous les Etats
désignés

☐

tous les Etats désignés sauf les Etats-
Unis d'Amérique

☒

Les Etats-Unis
d'Amérique seulement

☐

les Etats indiqués dans
le cadre supplémentaire

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Etat où le déposant a son domicile si aucun domicile n'est indiqué ci-dessous.)

MARGOTTIN Florence
30 rue de Lourmel
75015 PARIS
France

Cette personne est :

- ☐ déposant seulement
☒ déposant et inventeur
☐ inventeur seulement
Si cette case est cochée, ne pas remplir la suite.)

Nationalité (nom de l'état) : FRANCE

Domicile de l'état (nom de l'état) : FRANCE

Cette personne est
déposant pour :

☐

tous les Etats
désignés

☐

tous les Etats désignés sauf les Etats-
Unis d'Amérique

☒

Les Etats-Unis
d'Amérique seulement

☐

les Etats indiqués dans
le cadre supplémentaire

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Etat où le déposant a son domicile si aucun domicile n'est indiqué ci-dessous.)

DURAND Hervé
20ter rue Damalouise
91850 BOURAY/JUINE
France

Cette personne est :

- ☐ déposant seulement
☒ déposant et inventeur
☐ inventeur seulement
Si cette case est cochée, ne pas remplir la suite.)

Nationalité (nom de l'état) : FRANCE

Domicile de l'état (nom de l'état) : FRANCE

Cette personne est
déposant pour :

☐

tous les Etats
désignés

☐

tous les Etats désignés sauf les Etats-
Unis d'Amérique

☒

Les Etats-Unis
d'Amérique seulement

☐

les Etats indiqués dans
le cadre supplémentaire

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Etat où le déposant a son domicile si aucun domicile n'est indiqué ci-dessous.)

ARENZANA SEISDEDOS Fernando
18 rue de Rushmoor
92190 MEUDON
France

Cette personne est :

- ☐ déposant seulement
☒ déposant et inventeur
☐ inventeur seulement
Si cette case est cochée, ne pas remplir la suite.)

Nationalité (nom de l'état) : ESPAGNE

Domicile de l'état (nom de l'état) : FRANCE

Cette personne est
déposant pour :

☐

tous les Etats
désignés

☐

tous les Etats désignés sauf les Etats-
Unis d'Amérique

☒

Les Etats-Unis
d'Amérique seulement

☐

les Etats indiqués dans
le cadre supplémentaire

☒ D'autres déposants ou inventeurs sont indiqués sur une feuille annexe.

Suite du cadre n° III AUTRES DEPOSANTS OU (AUTRES) INVENTEURS

Si aucun des sous-cadres suivants ne sont utilisés, la présente feuille ne doit pas être incluse dans la requête

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Etat où le déposant a son domicile si aucun domicile n'est indiqué ci-dessous.)

KROLL Mathias
22 rue Labrouste
75015 PARIS
France

Cette personne est :

- ☐ déposant seulement
☒ déposant et inventeur
☐ inventeur seulement
*Si cette case est cochée,
ne pas remplir la suite.)*

Nationalité (nom de l'état) : ALLEMAGNE

Domicile de l'état (nom de l'état): FRANCE

Cette personne est déposant pour : ☐ tous les Etats désignés ☐ tous les Etats désignés sauf les Etats-Unis d'Amérique ☒ Les Etats-Unis d'Amérique seulement ☐ les Etats indiqués dans le cadre supplémentaire

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Etat où le déposant a son domicile si aucun domicile n'est indiqué ci-dessous.)

CONCORDET Jean-Paul
41 rue de Montreuil
94300 VINCENNES
France

Cette personne est :

- ☐ déposant seulement
☒ déposant et inventeur
☐ inventeur seulement
*Si cette case est cochée,
ne pas remplir la suite.)*

Nationalité (nom de l'état) : FRANCE

Domicile de l'état (nom de l'état): FRANCE

Cette personne est déposant pour : ☐ tous les Etats désignés ☐ tous les Etats désignés sauf les Etats-Unis d'Amérique ☒ Les Etats-Unis d'Amérique seulement ☐ les Etats indiqués dans le cadre supplémentaire

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Etat où le déposant a son domicile si aucun domicile n'est indiqué ci-dessous.)

Cette personne est :

- ☐ déposant seulement
☐ déposant et inventeur
☐ inventeur seulement
*Si cette case est cochée,
ne pas remplir la suite.)*

Nationalité (nom de l'état) :

Domicile de l'état (nom de l'état):

Cette personne est déposant pour : ☐ tous les Etats désignés ☐ tous les Etats désignés sauf les Etats-Unis d'Amérique ☐ Les Etats-Unis d'Amérique seulement ☐ les Etats indiqués dans le cadre supplémentaire

Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Le pays de l'adresse indiquée dans ce cadre est l'Etat où le déposant a son domicile si aucun domicile n'est indiqué ci-dessous.)

Cette personne est :

- ☐ déposant seulement
☐ déposant et inventeur
☐ inventeur seulement
*Si cette case est cochée,
ne pas remplir la suite.)*

Nationalité (nom de l'état) :

Domicile de l'état (nom de l'état):

Cette personne est déposant pour : ☐ tous les Etats désignés ☐ tous les Etats désignés sauf les Etats-Unis d'Amérique ☐ Les Etats-Unis d'Amérique seulement ☐ les Etats indiqués dans le cadre supplémentaire

☐ D'autres déposants ou inventeurs sont indiqués sur une feuille annexe.

Cadre n° V DÉSIGNATION D'ÉTATS

Les désignations suivantes sont faites conformément à la règle 4.9.a) (cocher les cases appropriées: une au moins doit l'être):

Brevet régional

- ☒ AP Brevet ARIPO : GH Ghana, GM Gambie, KE Kenya, LS Lesotho, MW Malawi, SD Soudan, SZ Swaziland, UG Ouganda, ZW Zimbabwe et tout autre État qui est un État contractant du Protocole de Harare et du PCT
- ☒ EA Brevet eurasiatique : AM Arménie, AZ Azerbaïdjan, BY Bélarus, KG Kirghizistan, KZ Kazakhstan, MD République de Moldova, RU Fédération de Russie, TJ Tadjikistan, TM Turkménistan et tout autre État qui est un État contractant de la Convention sur le brevet eurasiatique et du PCT
- ☒ EP Brevet européen : AT Autriche, BE Belgique, CH et LI Suisse et Liechtenstein, CY Chypre, DE Allemagne, DK Danemark, ES Espagne, FI Finlande, FR France, GB Royaume-Uni, GR Grèce, IE Irlande, IT Italie, LU Luxembourg, MC Monaco, NL Pays-Bas, PT Portugal, SE Suède et tout autre État qui est un État contractant de la Convention sur le brevet européen et du PCT
- ☒ OA Brevet OAPI : BF Burkina Faso, BJ Bénin, CF République centrafricaine, CG Congo, CI Côte d'Ivoire, CM Cameroun, GA Gabon, GN Guinée, GW Guinée-Bissau, ML Mali, MR Mauritanie, NE Niger, SN Sénégal, TD Tchad, TG Togo et tout autre État qui est un État membre de l'OAPI et un État contractant du PCT (si une autre forme de protection ou de traitement est souhaitée, le préciser sur la ligne pointillée)

Brevet national (si une autre forme de protection ou de traitement est souhaitée, le préciser sur la ligne pointillée):

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AL Albanie | <input checked="" type="checkbox"/> LS Lesotho |
| <input checked="" type="checkbox"/> AM Arménie | <input checked="" type="checkbox"/> LT Lituanie |
| <input checked="" type="checkbox"/> AT Autriche | <input checked="" type="checkbox"/> LU Luxembourg |
| <input checked="" type="checkbox"/> AU Australie | <input checked="" type="checkbox"/> LV Lettonie |
| <input checked="" type="checkbox"/> AZ Azerbaïdjan | <input checked="" type="checkbox"/> MD République de Moldova |
| <input checked="" type="checkbox"/> BA Bosnie-Herzégovine | <input checked="" type="checkbox"/> MG Madagascar |
| <input checked="" type="checkbox"/> BB Barbade | <input checked="" type="checkbox"/> MK Ex-République yougoslave de Macédoine |
| <input checked="" type="checkbox"/> BG Bulgarie | <input checked="" type="checkbox"/> MN Mongolie |
| <input checked="" type="checkbox"/> BR Brésil | <input checked="" type="checkbox"/> MW Malawi |
| <input checked="" type="checkbox"/> BY Bélarus | <input checked="" type="checkbox"/> MX Mexique |
| <input checked="" type="checkbox"/> CA Canada | <input checked="" type="checkbox"/> NO Norvège |
| <input checked="" type="checkbox"/> CH et LI Suisse et Liechtenstein | <input checked="" type="checkbox"/> NZ Nouvelle-Zélande |
| <input checked="" type="checkbox"/> CN Chine | <input checked="" type="checkbox"/> PL Pologne |
| <input checked="" type="checkbox"/> CU Cuba | <input checked="" type="checkbox"/> PT Portugal |
| <input checked="" type="checkbox"/> CZ République tchèque | <input checked="" type="checkbox"/> RO Roumanie |
| <input checked="" type="checkbox"/> DE Allemagne | <input checked="" type="checkbox"/> RU Fédération de Russie |
| <input checked="" type="checkbox"/> DK Danemark | <input checked="" type="checkbox"/> SD Soudan |
| <input checked="" type="checkbox"/> EE Estonie | <input checked="" type="checkbox"/> SE Suède |
| <input checked="" type="checkbox"/> ES Espagne | <input checked="" type="checkbox"/> SG Singapour |
| <input checked="" type="checkbox"/> FI Finlande | <input checked="" type="checkbox"/> SI Slovénie |
| <input checked="" type="checkbox"/> GB Royaume-Uni | <input checked="" type="checkbox"/> SK Slovaquie |
| <input checked="" type="checkbox"/> GD Grenade | <input checked="" type="checkbox"/> SL Sierra Leone |
| <input checked="" type="checkbox"/> GE Géorgie | <input checked="" type="checkbox"/> TJ Tadjikistan |
| <input checked="" type="checkbox"/> GH Ghana | <input checked="" type="checkbox"/> TM Turkménistan |
| <input checked="" type="checkbox"/> GM Gambie | <input checked="" type="checkbox"/> TR Turquie |
| <input checked="" type="checkbox"/> HR Croatie | <input checked="" type="checkbox"/> TT Trinité-et-Tobago |
| <input checked="" type="checkbox"/> HU Hongrie | <input checked="" type="checkbox"/> UA Ukraine |
| <input checked="" type="checkbox"/> ID Indonésie | <input checked="" type="checkbox"/> UG Ouganda |
| <input checked="" type="checkbox"/> IL Israël | <input checked="" type="checkbox"/> US États-Unis d'Amérique |
| <input checked="" type="checkbox"/> IN Inde | <input checked="" type="checkbox"/> UZ Ouzbékistan |
| <input checked="" type="checkbox"/> IS Islande | <input checked="" type="checkbox"/> VN Viet Nam |
| <input checked="" type="checkbox"/> JP Japon | <input checked="" type="checkbox"/> YU Yougoslavie |
| <input checked="" type="checkbox"/> KE Kenya | <input checked="" type="checkbox"/> ZW Zimbabwe |
| <input checked="" type="checkbox"/> KG Kirghizistan | |
| <input checked="" type="checkbox"/> KP République populaire démocratique de Corée | |
| <input checked="" type="checkbox"/> KR République de Corée | |
| <input checked="" type="checkbox"/> KZ Kazakhstan | |
| <input checked="" type="checkbox"/> LC Sainte-Lucie | |
| <input checked="" type="checkbox"/> LK Sri Lanka | |
| <input checked="" type="checkbox"/> LR Libéria | |

Cases réservées pour la désignation (aux fins d'un brevet national) d'États qui sont devenus parties au PCT après la publication de la présente feuille :

Déclaration concernant les désignations de précaution : outre les désignations faites ci-dessus, le déposant fait aussi conformément à la règle 4.9.b) toutes les désignations qui seraient autorisées en vertu du PCT, à l'exception de toute désignation indiquée dans le cadre supplémentaire comme étant exclue de la portée de cette déclaration. Le déposant déclare que ces désignations additionnelles sont faites sous réserve de confirmation et que toute désignation qui n'est pas confirmée avant l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de la date de priorité doit être considérée comme retirée par le déposant à l'expiration de ce délai. (Pour confirmer une désignation, il faut déposer une déclaration contenant la désignation en question et payer les taxes de désignation et de confirmation. La confirmation doit parvenir à l'office récepteur dans le délai de 15 mois.)

Cadre n° VI REVENDECTION DE PRIORITE
☐ Les revendications de priorité sont indiquées dans le cadre supplémentaire.

Date de dépôt de la demande antérieure (jour/mois/année)	Numéro de la demande antérieure	Lorsque la demande antérieure est une :		
		demande nationale : pays	demande régionale : office régional	demande internationale : office récepteur
(1) 30 janvier 1998 (30/01/1998)	98 01100	FRANCE		
(2) 09 Décembre 1998 (09/12/1998)	98 15545	FRANCE		
(3)				

☐ L'office récepteur est prié de préparer, et de transmettre au Bureau international, une copie certifiée conforme de la ou des demandes antérieures (seulement si la demande antérieure a été déposée auprès de l'office qui, aux fins de la présente demande internationale, est l'office récepteur) indiquées ci-dessus au(x) point(s): _____

* Si la demande antérieure est une demande ARIPO, il est obligatoire d'indiquer dans le cadre supplémentaire au moins un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour lequel cette demande antérieure a été déposée (règle 4.10.b)ii)). Voir le cadre supplémentaire

Cadre n° VII ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Choix de l'administration chargée de la recherche internationale (ISA) (Si plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes pour procéder à la recherche internationale, indiquer l'administration choisie; le code à deux lettres peut être utilisé):

ISA /

Demande d'utilisation des résultats d'une recherche antérieure; mention de cette recherche (si une recherche antérieure a été effectuée par l'administration chargée de la recherche internationale ou demandée à cette dernière):

Date (jour/mois/année)

Numéro

Pays (ou office régional)

27 octobre 1998

FA 552886

FRANCE

Cadre n° VIII BORDEREAU; LANGUE DE DEPOT

La présente demande internationale contient le nombre de feuilles suivant :

requête : 05
description (sauf partie réservée au listage des séquences) : 37
revendications : 05
abrégé : 01
dessins : 12
partie de la description réservée au listage des séquences : 07
Nombre total de feuilles : 67

Le ou les éléments cochés ci-après sont joints à la présente demande internationale :

- ☒ feuille de calcul des taxes
- ☐ pouvoir distinct signé
- ☐ copie du pouvoir général; numéro de référence, le cas échéant :
- ☐ explication de l'absence d'une signature
- ☐ document(s) de priorité indiqué(s) dans le cadre N° VI au(x) point(s) :
- ☐ traduction de la demande internationale en (langue) :
- ☐ indications séparées concernant des micro-organismes ou autre matériel biologique déposés
- ☒ listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sous forme déchiffrable par ordinateur
- ☒ autres éléments (préciser) **RAPPORT DE RECHERCHE**

Figure des dessins qui doit accompagner l'abrégé :

langue de dépôt de la demande internationale : FRANCAISE

Cadre n° IX SIGNATURE DU DEPOSANT OU DU MANDATAIRE

A côté de chaque signature, indiquer le nom du signataire et, si cela n'apparaît pas clairement à la lecture de la requête, à quel titre l'intéressé signe.

GILLARD Marie-Louise
CABINET BEAU DE LOMENIE

Réservé à l'office récepteur

1. Date effective de réception des pièces supposées constituer la demande internationale :	2. Dessins :
3. Date effective de réception, rectifiée en raison de la réception ultérieure, mais dans les délais, de documents ou de dessins complétant ce qui est supposé constituer la demande internationale :	<input type="checkbox"/> reçus :
4. Date de réception, dans les délais, des corrections demandées selon l'article 11.2) du PCT :	<input type="checkbox"/> non reçus :
5. Administration chargée de la recherche internationale indiquée par le déposant: ISA/	6. <input type="checkbox"/> Transmission de la copie de recherche différée jusqu'au paiement de la taxe de recherche

Réservé au Bureau international

Date de réception de l'exemplaire original par le Bureau international :

Protéine humaine β TrCP de ciblage des protéines vers les voies de dégradation par le protéasome

La présente invention a pour objet une nouvelle protéine humaine qui intervient dans le ciblage des protéines vers les voies de dégradation par le
5 protéasome. Cette protéine, dénommée h- β TrCP, est capable d'interagir notamment avec la protéine Vpu du virus HIV-1, ainsi qu'avec les protéines cellulaires I κ B, β -caténine et Skp1p.

La dégradation des protéines par le protéasome, complexe multi-protéique présent dans toutes les cellules, est impliquée dans de nombreux
10 phénomènes cellulaires essentiels comme le contrôle de la prolifération cellulaire, le renouvellement des protéines et l'élimination des protéines incorrectement repliées, en particulier au niveau du réticulum endoplasmique (CIECHANOVER, A., Cell, 79, 13-21, 1994). De nombreux virus, comme le virus HIV-1 qui dégrade CD4 par l'intermédiaire d'une de ses protéines Vpu (TRONO D., Cell, 82, 189-
15 1992, 1995), utilisent à leur profit ces voies cellulaires de dégradation des protéines, dans lesquelles les protéines sont ciblées vers le protéasome par des interactions diverses avec d'autres protéines avant d'être dégradées. Pour être ciblées vers le protéasome et dégradées par celui-ci, les protéines doivent généralement être au préalable ubiquitinylées par des complexes ubiquitine-ligase.
20 De plus, pour être ubiquitinylées, les protéines doivent souvent subir des modifications telles que des phosphorylations (CIECHANOVER, A. Embo. J., 17, 7151-7160, 1998).

A ce jour, on connaît plusieurs autres protéines de type β TrCP :

- la protéine β TrCP de Xenope décrite par Spevak et al. (Mol. Cell.
25 Biol., 13, 4953-4966, 1993) ;
- la protéine Slimb de la drosophile décrite par Jiang et al. (Nature, vol. 391, 29 Janvier 1998) ;
- la protéine KIAA0696 mise en évidence par Ishikawa et al. (DNA Research, 5, 169-176, 1998) à l'occasion d'une analyse systématique de séquences
30 exprimées dans le cerveau.

Jiang et al. ont montré que la protéine Slimb chez la drosophile est impliquée dans la stabilité de la protéine Armadillo et la signalisation de deux voies métaboliques essentielles pour le développement, à savoir les voies Hedgehog et Wingless. Ils ont également montré que la protéine Slimb a une

5 homologie de 80% environ avec la protéine β TrCP de Xenope dont aucune fonction n'a été décrite par Spevak et al. Comme la β -caténine chez le Xenope ou chez l'homme, qui est l'homologue de la protéine Armadillo de la drosophile, semble être ciblée vers les voies de dégradation du protéasome en l'absence de

10 signalisation des voies Hedgehog et Wingless, ils suggèrent que chez l'homme, les gènes codant pour les homologues de Slimb pourraient être impliqués dans la dégradation protéolytique de la β -caténine, protéine qui acquiert des propriétés oncogéniques quand elle n'est pas dégradée (POLAKIS, P., Biochim. Biophys. Acta 1332, F127-47, 1997).

Toutefois, même si la conservation des voies Wingless et Hedgehog

15 chez les vertébrés est importante, il n'est pas pour autant certain que la conservation des fonctions des protéines homologues sera totale. Il y a d'ailleurs de nombreux exemples qui montrent qu'il y a toujours des différences significatives entre espèces.

De plus, Jiang et al. ont établi l'implication de Slimb dans le contrôle

20 des voies Wingless et Hedgehog chez la drosophile uniquement sur la base d'études génétiques. Aucune preuve que ce contrôle est dépendant d'une interaction directe entre Slimb et Armadillo, par exemple, n'est ni recherchée, ni apportée.

La protéine selon l'invention, dénommée h- β TrCP, est capable

25 d'interagir avec les protéines virales ou les protéines cellulaires susceptibles de servir de médiateurs ou d'être dégradées par le protéasome. En particulier, la protéine h- β TrCP est capable d'interagir, notamment avec la protéine Vpu du virus HIV-1, ainsi qu'avec les protéines cellulaires I κ B et β -caténine.

Elle est particulièrement utile pour le criblage d'agents thérapeutiques,

30 tels que notamment des agents antitumoraux, antiviraux, anti-inflammatoires et anti-Alzheimer.

La protéine Vpu est une petite protéine membranaire de 81 acides aminés, exprimée par la plupart des isolats du virus HIV-1 mais ni par ceux du virus humain HIV-2 nettement moins pathogène, ni par ceux du virus simien SIV (COHEN et al., Nature, 334, 532-534, 1988 ; et STREBEL et al., Science, 2, 1221-1223, 1988).

Une des fonctions de la protéine Vpu est sa capacité à induire la dégradation de la protéine CD4, récepteur cellulaire du virus HIV-1, participant ainsi à la diminution de l'expression du récepteur CD4 à la surface des cellules (Willey et al., J. Virol. 68, 1207-1212, 1994).

On sait également que les deux sérines de phosphorylation de la protéine Vpu, situées en position 52 et 56, sont indispensables pour la dégradation de CD4 induite par Vpu (MARGOTTIN et al., Virology, 223, 381-386, 1996). En outre, lors du processus d'infection par le virus HIV-1, en l'absence de la protéine Vpu, le précurseur d'enveloppe Gp160 et la protéine CD4 nouvellement synthétisée s'associent dans le réticulum endoplasmique, bloquant la maturation de la protéine Gp160 (BOUR et al., J. Virol., 65, 6387-6396, 1991). La dégradation du récepteur CD4 médiée par la protéine Vpu est essentielle pour libérer la protéine d'enveloppe virale qui est retenue dans le réticulum endoplasmique par sa liaison à CD4 grâce à l'interaction avec la sous-unité Gp120, et permettre la maturation normale de l'enveloppe vers la membrane plasmique et ultérieurement son intégration dans les particules virales, ce qui les rend infectieuses. Des études récentes ont mis en évidence le fait que la dégradation du récepteur CD4 médiée par la protéine Vpu est sensible aux inhibiteurs spécifiques du protéasome et est dépendante de la présence d'une "machinerie d'ubiquitinylation intacte" (FUJITA et al., J. Gen. Virol., 78, 619-625, 1997).

Ainsi, la protéine Vpu participe à des fonctions absolument critiques pour assurer la production de particules virales infectieuses en grand nombre, puisqu'elle intervient non seulement sur les produits du gène *gag*, c'est-à-dire sur les protéines de structure en augmentant le relâchement des particules virales, mais aussi sur ceux du gène *env* en permettant la maturation de la protéine d'enveloppe suite à la dégradation du récepteur CD4. MARGOTTIN et al. 1996

(*supra*) ont montré que l'interaction entre Vpu et CD4 se faisait par l'intermédiaire de leur domaine cytoplasmique et que cette interaction n'était pas suffisante pour déclencher la dégradation du récepteur CD4.

La protéine Skp1p est une protéine cellulaire impliquée dans le ciblage
 5 des protéines vers les voies de dégradation par le protéasome, lequel dépend de l'ubiquitinylation des protéines (PICKART C.M., The FASEB Journal, 11, 1055-1066, 1997).

BAI et al. (Cell, 86, 263-274, 1996) ont montré que la protéine Skp1p
 était nécessaire pour la protéolyse médiée par l'ubiquitine et que cette dégradation
 10 se faisait grâce à l'interaction de Skp1p avec des protéines contenant un motif dénommé boîte F.

La protéine Skp1p est un facteur essentiel de ciblage de protéines
 régulatrices du cycle cellulaire par le protéasome. Le ciblage de la dégradation de
 ces régulateurs est en particulier nécessaire à l'entrée du cycle cellulaire en phase
 15 S de synthèse d'ADN (PAGANO, M., The FASEB Journal, 11, 1068-1075, 1997). Des études récentes ont montré que la protéine Skp1p, avec des protéines à boîte F sont les éléments essentiels de complexes de haut poids moléculaires appelés SCF pour "Skp1p-Cullin-F-box-protein complexes". Ces complexes SCF jouent le rôle d'enzyme E3 qui par leur activité ubiquitine-ligase permettent la dernière étape de
 20 l'ubiquitinylation de protéines substrats qui sont ainsi ciblées vers la dégradation par le protéasome (HOYT, A, Cell, 91, 149-151, 1997). Par ailleurs, on notera qu'il n'existe pas à ce jour d'homologue de Skp1p identifié chez la drosophile.

La protéine I κ B, qui existe sous différentes formes (α , β , ϵ), est
 l'inhibiteur majeur du facteur de transcription NF κ B, qui maintient celui-ci sous la
 25 forme d'un complexe inactif dans le cytoplasme (Beg A. et al. Genes and Dev., 7, 2064-2070, 1993). Après stimulation des cellules par des facteurs tels que l'interleukine 1 (IL1) et le facteur de nécrose tumorale (TNF), la protéine I κ B est phosphorylée sur les résidus sérine S32 et S36. Cette phosphorylation conduit très rapidement à l'ubiquitinylation de la protéine et à son ciblage vers la dégradation
 30 par le protéasome. Le facteur NF κ B actif, par exemple sous la forme de deux sous-unités P50 et P65, est alors libéré, importé dans le noyau où il va pouvoir

activer de très nombreux gènes et entraîner notamment des phénomènes inflammatoires.

La protéine β -caténine est une protéine cellulaire qui contrôle les voies essentielles de transduction de signaux, comme les voies Wingleless, qui sont très conservées chez tous les vertébrés. (MILLER et al., Genes and Dev. 10, 2527-2539, 1996 et POLAKIS, P., Biochim. Biophys. Acta 1332, F 127-47, 1997). La β -caténine s'accumule dans les cellules cancéreuses, soit par suite de mutations qui empêchent la phosphorylation sur les résidus sérine 33 et 37 (protéines β -caténines mutées), soit par suite de mutations de son co-facteur, la protéine APC, qui est nécessaire à sa dégradation.

L'accumulation de la β -caténine, liée à sa non-dégradation, conduit à son importation dans le noyau et à l'activation de gènes contrôlés par des promoteurs TCF-LEF, ce qui provoque des phénomènes de transformation et prolifération cellulaire.

Il a été montré récemment que des mutations de la preseniline-1 chez des patients atteints de la maladie d'Alzheimer entraînaient une déstabilisation et une dégradation accrue de la β -caténine (ZHANG et al., Nature, 395, 698-702, 1998). Ces auteurs ont montré que la preseniline-1 non mutée se lie à la β -caténine et contribue ainsi à sa stabilité. Dans la maladie d'Alzheimer, la preseniline mutée n'est plus capable de se lier à la β -caténine, et cette dernière est alors dégradée plus rapidement. Le niveau de β -caténine est nettement diminué dans les cellules neuronales de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. La perte de la β -caténine entraîne une apoptose accrue des cellules neuronales qui serait responsable de la perte neuronale constatée dans cette pathologie.

On comprend aisément qu'il est urgent de trouver des moyens pour moduler, à savoir activer ou inhiber, le ciblage des protéines vers le protéasome.

On a maintenant trouvé une nouvelle protéine humaine qui est une protéine qui intervient dans le ciblage des protéines vers les voies de dégradation par le protéasome et qui permet de cribler des agents modulateurs du ciblage des protéines vers le protéasome.

La présente invention a donc pour objet une nouvelle protéine humaine, dénommée h- β TrCP, qui présente la SEQ ID No.2 et qui intervient dans le ciblage des protéines vers les voies de dégradation par le protéasome.

La protéine h- β TrCP possède 569 acides aminés et comporte une boîte
 5 F et sept motifs WD dont la position dans la séquence SEQ ID N° 2 est la suivante :

- boîte F : acides aminés 147-191,
- premier motif WD : acides aminés 259-292,
- deuxième motif WD : acides aminés 304-332,
- 10 - troisième motif WD : acides aminés 343-372,
- quatrième motif WD : acides aminés 387-415,
- cinquième motif WD : acides aminés 427-455,
- sixième motif WD : acides aminés 467-492,
- septième motif WD : acides aminés 516-544.

15 En raison de l'homologie de cette nouvelle protéine avec la β TrCP de Xenope, protéine contenant des motifs β -transducine et connue en langue anglaise sous la dénomination " beta transducin repeats containing protein", la protéine de l'invention est dénommée h- β TrCP (human- β TrCP).

La protéine h- β TrCP de l'invention est capable d'interagir, par
 20 l'intermédiaire de ses motifs WD, avec les protéines susceptibles d'être dégradées par le protéasome, en particulier avec les protéines virales et les protéines cellulaires qui possèdent le motif de phosphorylation comprenant les acides aminés Asp-Ser-Gly-Xaa-Xaa-Ser dans lequel Xaa est un acide aminé naturel quelconque et dans lequel les résidus sérine sont phosphorylés.

25 La phosphorylation de ce motif Asp-Ser-Gly-Xaa-Xaa-Ser est indispensable à l'ubiquitinylation et à la dégradation ultérieure des protéines qui possèdent ce type de motif. La protéine h- β TrCP n'est capable d'interagir avec les protéines contenant ce motif que lorsque les deux résidus sérine sont phosphorylés et elle ne peut interagir avec des protéines contenant un motif de phosphorylation
 30 dans lequel les résidus sérine sont mutés en acides aminés non phosphorylables. En interagissant avec les protéines phosphorylées sur ce motif, la protéine

h- β TrCP contrôle leur ubiquitinylation et leur criblage vers le protéasome en vue de leur dégradation.

Parmi ces protéines, on peut citer notamment la protéine virale Vpu et les protéines cellulaires I κ B et β -caténine.

5 On a aussi trouvé que la protéine h- β TrCP interagit, par l'intermédiaire de sa boîte F, avec la protéine Skp1p ; elle fait donc partie d'un nouveau complexe SCF, SCF-h- β TrCP, qui sélectionne certaines protéines cellulaires ou virales qui doivent être dégradées par le protéasome.

10 Par l'activité de ciblage vers les voies de dégradation par le protéasome, la protéine h- β TrCP, selon l'invention, joue le rôle de médiateur cellulaire de la protéine Vpu dans les cellules infectées par le virus HIV-1.

15 Sans pour autant vouloir se limiter à une théorie quelconque, on pense que, dans les cellules infectées par le virus HIV-1, le virus utilise, par l'intermédiaire de la protéine Vpu, le complexe SCF, dont la protéine β TrCP fait partie pour induire la dégradation du récepteur CD4 qui va favoriser la réplication virale et le relâchement des virions infectieux.

20 L'invention a aussi pour objet les fragments peptidiques de la protéine h- β TrCP résultant de l'addition, la suppression et/ou le remplacement d'un ou plusieurs acides aminés, lesdits fragments peptidiques ayant conservé l'activité d'interaction avec les protéines susceptibles d'être dégradées par le protéasome, en particulier avec la protéine Vpu du virus HIV-1, avec la protéine cellulaire I κ B ou la protéine cellulaire β -caténine et/ou avec la protéine Skp1p.

25 L'invention concerne en particulier les fragments peptidiques qui comprennent au moins l'une des séquences en acides aminés de h- β TrCP ci-après :

251-569,

292-569,

292-396,

292-545 et

30 1-291.

On préfère tout particulièrement les fragments peptidiques dénués en partie ou en totalité de la boîte F ou ceux qui sont dénués en partie ou en totalité des motifs WD.

Un fragment peptidique particulièrement préféré est le mutant délété
5 des résidus 32-179, dénommé ci-après β TrCP Δ F.

La présente invention a également pour objet les séquences d'acides nucléiques, à savoir les séquences d'ADN génomique, les séquences d'ADNc ou d'ARNm qui comprennent ou sont constituées par un enchaînement de nucléotides codant pour la protéine h- β TrCP ou pour l'un quelconque de ses fragments
10 peptidiques tels que définis précédemment.

L'invention concerne notamment les séquences d'acides nucléiques codant pour la protéine h- β TrCP et ses fragments peptidiques décrits ci-dessus qui sont représentées par :

- a) les séquences d'ADNc SEQ ID No.1 codant pour ladite protéine h- β TrCP et
15 des fragments d'acides nucléiques codant pour lesdits fragments peptidiques ;
- b) les séquences d'ADN hybridant dans des conditions strictes avec les séquences ci-dessus ;
- c) les séquences d'ADN qui, en raison de la dégénérescence du code génétique, résultent des séquences a) et b) ci-dessus et codent pour la protéine h- β TrCP ou
20 ses fragments ; et
- d) les séquences d'ARNm et d'ADN correspondantes.

Les protéines et fragments peptidiques selon l'invention peuvent être obtenus par la technique du génie génétique qui comprend les étapes de :
- culture d'un microorganisme transformé ou de cellules eucaryotes transformées à
25 l'aide d'une séquence d'acides nucléiques selon l'invention et
- récupération de la protéine ou du fragment peptidique produit par ledit microorganisme ou lesdites cellules eucaryotes.

Cette technique est bien connue de l'homme du métier. Pour plus de détail la concernant, on pourra se référer à l'ouvrage ci-après : Recombinant DNA
30 Technology I, Editors Ales Prokop, Raskesh K Bajpai ; Annals of the New-York Academy of Sciences, volume 646, 1991.

Ils peuvent également être préparés par les synthèses peptidiques classiques bien connues de l'homme du métier.

Les acides nucléiques selon l'invention peuvent être préparés par synthèse chimique et génie génétique en utilisant les techniques bien connues de l'homme du métier et décrites par exemple dans SAMBROOK et al. (*supra*).

Par exemple, la synthèse des séquences d'ADNc selon l'invention peut être effectuée par amplification des ARNm de cellules humaines à l'aide de la méthode PCR (Polymerase Chain Reaction), comme décrit par exemple par GOBLET et al. (Nucleic Acid Research, 17, 2144, 1989) en utilisant des oligonucléotides synthétiques comme amorces, définis à partir de la séquence d'ADN SEQ ID No.1.

Le fragment d'acides nucléiques amplifié peut ensuite être cloné selon les techniques décrites dans AUSUBEL et al. (Current Protocols in Molecular Biology, chapter 3, *supra*).

L'invention a également pour objet des animaux transgéniques exprimant un transgène de la protéine h- β TrCP de l'invention ou des animaux transgéniques dans lesquels le gène β TrCP a été invalidé.

Ces animaux transgéniques ou invalidés pour le gène de la protéine h- β TrCP pourront servir de modèles d'étude *in vivo* de la perturbation du cycle cellulaire et de la prolifération par l'absence ou la surexpression du gène de la protéine h- β TrCP ou de formes tronquées ou mutées de cette protéine, de la protéine Skp1p, de la protéine Vpu, de la protéine I κ B ou de la protéine β -caténine.

Ces animaux transgéniques sont obtenus par des techniques bien connues de l'homme du métier, telles que celles décrites dans Manipulating the mouse embryo: a laboratory manual. HOGAN, B., BEDDINGTON, R., COSTANTINI, F. & LACY, E. Cold Spring Harbor laboratory press, second edition, 1994.

A titre d'animaux, on préfère les mammifères tels que la souris ou le rat.

L'invention a également pour objet les microorganismes procaryotes et les cellules eucaryotes transformés à l'aide d'un vecteur d'expression contenant une séquence d'ADN selon l'invention. Ce vecteur d'expression, qui peut être par exemple sous la forme d'un plasmide, doit comporter, outre la séquence d'ADN de l'invention, les moyens nécessaires à son expression, tels que notamment un promoteur, un terminateur de transcription, une origine de réplication et de préférence un marqueur de sélection. La transformation des microorganismes et des cellules eucaryotes est une technique bien connue de l'homme du métier qui pourra aisément déterminer, en fonction du microorganisme à transformer, les moyens nécessaires à l'expression de la séquence d'ADN selon l'invention.

Le microorganisme préféré aux fins de l'invention est *E. coli* alors qu'on utilise de préférence *Saccharomyces cerevisiae* comme levure.

A titre d'exemples de cellules eucaryotes qui conviennent aux fins de l'invention, on peut citer notamment les cellules COS, CHO, SF9, Jurkat, etc., toutes étant répertoriées à l'ATCC.

L'invention a également pour objet les cellules eucaryotes co-transformées avec des vecteurs d'expression contenant d'une part la séquence d'ADN codant pour la protéine Vpu, pour la protéine Skp1p, pour la protéine I κ B ou pour les protéines β -caténine mutées, et d'autre part une séquence codant pour la protéine h- β TrCP, lesdits vecteurs d'expression contenant de plus des moyens utiles à leur expression, y compris dans le système double-hybride en levure.

La présente invention a donc également pour objet les agents antiviraux anti-HIV-1 qui sont constitués par les fragments peptidiques de la protéine h- β TrCP de l'invention qui ont conservé les propriétés d'interaction de la protéine h- β TrCP soit avec la protéine Vpu, soit avec la protéine Skp1p. Ces fragments peptidiques sont dénués de la boîte F ou des motifs WD de sorte qu'ils ne peuvent plus interagir avec la protéine Skp1p ou la protéine Vpu, respectivement.

On peut encore citer, à titre d'agents antiviraux, d'agents antitumoraux ou d'agents anti-inflammatoires, des anticorps dirigés contre la protéine h- β TrCP

de l'invention et ses fragments peptidiques, ce qui constitue un autre objet de l'invention.

Ces anticorps peuvent être des anticorps monoclonaux obtenus par le procédé bien connu de KOHLER et MILSTEIN (Nature, 256, 495-497, 1975) ou
 5 des anticorps polyclonaux obtenus selon les procédés classiques d'immunisation d'animaux (Antibodies, a laboratory manual. E. Harlow & D. Lane. Cold Spring Harbor laboratory press, 1988).

On peut enfin citer comme agents antiviraux, agents antitumoraux ou agents anti-inflammatoires, les oligonucléotides antisens bloquant la transcription
 10 ou la traduction de la protéine h-βTrCP de l'invention qui s'hybrident avec une séquence d'acides nucléiques telle que définie précédemment, ce qui constitue également un autre objet de la présente invention.

Ces oligonucléotides antisens sont préparés par des techniques bien connues de l'homme du métier, telles que celles décrites par AUSUBEL et al.
 15 (Current Protocols in Molecular Biology, Green Publishing Associates and Wiley-Interscience, New-York, 1989, Mises à jour jusqu'en 1997).

Les fragments peptidiques de h-βTrCP, qui possèdent la boîte F ou qui ont conservé à la fois les motifs WD et la boîte F, peuvent être utilisés comme agents antitumoraux ou anti-inflammatoires.

20 Les fragments peptidiques de h-βTrCP, qui sont dépourvus de la boîte F, peuvent être utilisés en thérapie génique pour le traitement des maladies inflammatoires ostéo-articulaires ou des syndromes inflammatoires aiguës qui s'accompagnent d'une activation de NFκB induite par la libération massive de TNFα lors de ces processus.

25 Comme illustré sur la figure 7, l'expression de h-βTrCPΔF est capable d'inhiber massivement par un facteur d'environ 20 fois l'activation transcriptionnelle induite par TNFα. Donc dans toutes les pathologies marquées par une réaction inflammatoire intense due à une libération de TNFα, la h-βTrCPΔF pourrait agir comme un puissant agent anti-inflammatoire. Il y a par
 30 exemple actuellement plusieurs tentatives pour mettre en oeuvre une thérapie génique de la polyarthrite rhumatoïde, avec injection dans les articulations lésées

de virus recombinants. On peut utiliser dans ces essais de thérapie génique des syndromes inflammatoires, des vecteurs exprimant la h- β TrCP Δ F. Ces vecteurs pourront être de plusieurs types (rétrovirus, adénovirus ; ANDERSON F., Nature, 392, 25-30, 1998). L'expression de la h- β TrCP Δ F pourra être contrôlée par ses effets sur l'inhibition de l'activation de NF κ B par TNF.

La présente invention a aussi pour objet l'utilisation de la protéine h- β TrCP ou des séquences d'acides nucléiques codant pour cette protéine ou pour ses fragments peptidiques pour le criblage d'agents thérapeutiques susceptibles de moduler l'interaction de la protéine h- β TrCP avec les protéines susceptibles d'être dégradées par le protéasome, en particulier pour le criblage :

- d'agents antiviraux anti-HIV-1 susceptibles d'inhiber l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine Vpu et/ou d'inhiber l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine Skp1p,
- d'agents antitumoraux capables de perturber la régulation du cycle cellulaire ou des processus de dégradation des protéines dans des cellules humaines tumorales par modulation (inhibition ou activation) de l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine Skp1p, ainsi que par réactivation de l'interaction entre la protéine h- β TrCP et les protéines β -caténine mutées dans les cellules tumorales ou entre la protéine β TrCP et la protéine β -caténine normale dans les cellules tumorales dépourvues de la protéine APC.
- d'agents anti-inflammatoires capables de perturber l'activation du facteur de transcription NF κ B par inhibition de l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine I κ B,
- d'agents anti-Alzheimer capables de réduire le taux de dégradation de la β -caténine dans les cellules neuronales par inhibition de l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine β -caténine.

En effet, en perturbant les interactions Vpu/h- β TrCP et/ou Skp1p/h- β TrCP, on peut :

- soit inhiber la réplication et la production du virus HIV-1 par des cellules infectées ;

- soit inhiber l'entrée en phase S du cycle cellulaire et avoir un effet antiprolifératif.

En perturbant les interactions I κ B/h- β TrCP et/ou Skp1p/h- β TrCP, on peut inhiber la dégradation de la protéine I κ B par le
5 protéasome et donc inhiber l'activation du facteur de transcription NF κ B.

Enfin, en activant l'interaction β -caténine mutée/h- β TrCP, on peut activer la dégradation de la β -caténine accumulée dans les cellules tumorales. En inhibant l'interaction β -caténine /h- β TrCP chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, on peut réduire l'apoptose des cellules neuronales.

10

Criblage de modulateurs de l'interaction h- β TrCP/protéines

On peut sélectionner les agents antiviraux soit à partir de banques aléatoires de peptides, à la surface de phages (SCOTT J. et al., Science, 249, 386-390, 1990), soit en utilisant des oligonucléotides de synthèse aléatoires selon la
15 technique de type SELEX (TUERK et GOLD, Science, 249, 505-510, 1990). Cette technique permet d'isoler à partir d'un pool très large d'oligonucléotides, ceux qui ont une grande affinité pour la protéine d'intérêt, dans le cas présent la protéine h- β TrCP. Ils sont dénommés aptamers. Parmi ces aptamers, on pourra sélectionner ceux qui inhibent les deux interactions Vpu/h- β TrCP et
20 Skp1p/h β TrCP par le criblage ci-après.

Le criblage défini ci-dessus peut par exemple être réalisé en utilisant le système double-hybride en levure dans lequel des cellules de levure co-exprimant la protéine h- β TrCP selon l'invention et l'une des protéines Vpu, I κ B ou β -caténine, la protéine Skp1p, sont cultivées sur des milieux sélectifs appropriés
25 en présence de la substance à tester ; les milieux sélectifs sont les milieux couramment utilisés dans ce domaine et donc bien connus de l'homme du métier.

Le système double-hybride en levure est décrit par FIELDS et SONG dans Nature, 340-245-246, 1989 et dans le brevet US 5 667 973. Ce système double-hybride, est basé sur la détection des interactions protéine-protéine par

activation du gène rapporteur His ou LacZ sous le contrôle de domaines de l'activateur transcriptionnel Gal4 dans la levure.

Dans ce système double-hybride, on cotransforme une levure par un vecteur double-hybride contenant l'ADNc de l'une des protéines et un vecteur
 5 contenant l'ADNc de l'autre protéine, chacun desdits vecteurs contenant soit un domaine de liaison à l'ADN soit un domaine d'activation de la transcription. On fait ensuite exprimer par la levure les deux protéines dans un milieu de culture approprié, par exemple un milieu de culture sans histidine. L'interaction entre les deux protéines hybrides permet l'activation du gène His3 et la croissance des
 10 levures sur un milieu sans histidine d'une part, ainsi que l'activation du gène LacZ qui est révélée par une réaction colorimétrique spécifique de la β -galactosidase. On peut donc vérifier l'interaction lorsque les levures poussent sur un milieu sans histidine et lorsqu'on observe une réaction colorimétrique.

On peut également utiliser le test du halo tel que décrit par Valtz &
 15 Peter (Meth-Enzymol-283, 350-365, 1997) pour détecter s'il y a interaction.

On peut également utiliser des variantes du système double-hybride, telles que le système triple-hybride décrit par TIRODE et al. (J. Biol. Chem., 272, 22995-22999, 1997), ou par COLAS et al. (Nature, 380, 548-550, 1996) dans lequel un peptide inhibiteur de l'interaction peut être exprimé comme troisième
 20 partenaire pour inhiber l'interaction des deux autres. Une banque de peptides aléatoires peut aussi être utilisée de la sorte.

On peut aussi utiliser le système reverse-hybride décrit par VIDAL et al. (Proc. Natl. Acad. Sci., 93, 10315-10320), dans lequel on sélectionne non pas pour une interaction mais contre une interaction. On peut dans ce système, comme
 25 dans le système double-hybride classique, cribler des banques de petites molécules chimiques, y compris issues de la synthèse chimique pour mettre, les levures co-transformées avec les vecteurs double-hybride ou reverse hybride porteurs des fusions avec la protéine Vpu, la protéine I κ B, la β -caténine, la protéine h- β TRCP ou la protéine Skp1p, en présence de ces petites molécules à la recherche d'un
 30 inhibiteur des interactions Vpu-h- β TrCP et Skp1p-h- β TrCP ou β -caténine-h- β TrCP ou encore I κ B-h- β TrCP.

Les tests de criblage d'inhibiteurs d'interaction pourront également être effectués en double-hybride par conjugaison (FROMONT-RACINE et al., Nature Genetics, 16, 277-282, 1997), par double-hybride membranaire (BRODER Y.C. et al., Curr. Biol., 8, 1121-1124, 1998), et éventuellement, si les phosphorylations
 5 peuvent prendre place dans les bactéries, par double-hybride bactérien (KARIMOVA et al., Proc. Natl. Acad. Sci., 95, 5752-5756, 1998).

Ce criblage peut aussi être effectué *in vitro* en utilisant l'une des protéines Vpu, IκB, β-caténine, ou la protéine Skp1p, et la protéine h-βTrCP, l'une des protéines étant immobilisée sur un support approprié et l'autre étant marquée
 10 par un moyen quelconque utilisé dans les moyens de détection de substances biologiques, ce moyen de marquage pouvant être par exemple un isotope radioactif, un agent luminescent, de la biotine ou un anticorps spécifique.

L'une des protéines sera de préférence immobilisée sous la forme d'une protéine de fusion avec la glutathion S-transférase (GST) sur des billes
 15 d'agarose-gluthation ou en plaques de microtitration, la GST servant d'agent de couplage de ladite protéine sur les billes ou sur les puits des plaques.

A cet effet, on peut utiliser notamment le test de scintillation à proximité (SPA) décrit par BOSWORTH et al. (Nature, 341, 167-168, 1989) et commercialisé par Amersham. Ce test consiste à marquer par un élément
 20 radioactif, par exemple le tritium, l'une des protéines et à immobiliser l'autre protéine sur des billes magnétiques ou sur des billes d'agarose-gluthation. L'effet inhibiteur des substances à tester sur les interactions impliquant la protéine h-βTrCP peut être facilement détecté sans séparation des espèces radioactives liées ou libres selon les protocoles décrits par BOSWORTH et al. (*supra*).

On peut également utiliser la technique "Surface Plasmon Resonances" décrite par KARLSSON et al. (J. Immunol. Methods, 145, 229-233, 1991) utilisant le Biacore commercialisé par Pharmacia, pour isoler les inhibiteurs des interactions impliquant la protéine h-βTrCP selon l'invention.
 25

L'activité inhibitrice des agents antiviraux ainsi sélectionnés pourra
 30 être vérifiée par des tests sur des cellules T CD₄⁺ ou sur des chimpanzés infectés par les virus HIV-1 ou SIV Cpz.

On peut également isoler les agents antitumoraux et les agents anti-inflammatoires, ligands de la protéine h- β TrCP de l'invention, par les techniques double-hybride ou apparentées ou par interaction *in vitro* avec des banques combinatoires de peptides ou autres produits chimiques, comme décrit
5 précédemment.

La spécificité des agents antiviraux, antitumoraux ou anti-inflammatoires sélectionnés par le test double-hybride peut être ensuite déterminée par culture de cellules de mammifères, par exemple de cellules humaines transfectées avec la protéine β -TrCP ou un fragment de celle-ci, en
10 présence d'un gène rapporteur spécifique de la protéine impliquée dans la pathologie que l'on souhaite traiter.

Ainsi, pour la protéine I κ B, on pourra utiliser des cellules humaines provenant des lignées cellulaires Hela, 293, 293T, etc. et le gène rapporteur dépendant des sites NF κ B (3Enh- κ B-ConA Luc) qui contrôle l'expression de la
15 luciférase.

Dans les cellules humaines non stimulées, la protéine β TrCP humaine est exprimée transitoirement à partir d'un vecteur d'expression eucaryote tel que pCDNA3 (Invitrogen) ou tout autre vecteur d'expression eucaryote, ayant inséré l'ADN codant pour la protéine β TrCP sous le contrôle d'un promoteur fort du
20 cytomégalo virus CMV ou autre. Une quantité de l'ordre de 3 μ g de ce vecteur qui permet l'expression de la protéine β TrCP sera cotransfectée par l'une des techniques courantes de transfection (phosphate de calcium, lipofectamine (Life technologies), électroporation (Ausubel et Sambrook, ci-après) etc., avec 1 μ g d'un vecteur rapporteur dépendant (3Enh- κ B-ConA luc) ou indépendant (RSV Luc ou
25 ConA Luc) de sites NF κ B qui contrôlent l'expression du gène rapporteur luciférase. Des molécules capables d'inhiber l'interaction h- β TrCP-I κ B inhiberont l'augmentation d'expression de luciférase dans ce test. Ces inhibiteurs seront ajoutés au milieu de culture pendant au moins 6 heures, 24, 36 ou 48 heures après la transfection. On pourra contrôler la spécificité de ces inhibiteurs en vérifiant
30 qu'ils n'ont aucun effet sur RSV Luc ou ConA Luc. On pourra également utiliser le

système Dual luciférase de Promega, dans lequel on peut tester en même temps deux vecteurs rapporteurs différents.

Selon un protocole expérimental similaire à celui décrit ci-dessus, mais avec des cellules stimulées, on pourra vérifier que l'inhibition induite par l'expression du fragment h- β TrCP Δ F sur l'activation transcriptionnelle TNF-dépendante a été annulée.

Ainsi, dans ce second test, les cellules humaines sont cotransfectées avec 1 μ g de vecteur rapporteur, soit 3Enh- κ B-ConA Luc, soit ConA Luc ou RSV Luc, avec 3 μ g de pCDNA3 exprimant le fragment peptidique h- β TrCP Δ F, mutant de la β TrCP délétée de sa boîte F. 24 à 48 h après la transfection, les cellules sont traitées pendant 6 h au TNF ou à l'acide okadaïque (OKA) qui sont de puissants activateurs de NF κ B (BAUERLE et al., Cell, 1996, 87, 13-20). Le mutant h- β TrCP Δ F a un effet inhibiteur massif sur l'expression du rapporteur luciférase, par rapport à un plasmide contrôle transfecté dans les mêmes conditions. Cet effet est dû à l'inhibition de la dégradation de I κ B induite par la liaison du mutant h- β TrCP Δ F en lieu et place de la protéine h- β TrCP sauvage endogène. De ce fait, un agent inhibiteur de l'interaction h- β TrCP-I κ B inhibera aussi l'interaction h- β TrCP Δ F-I κ B, et donc inversera l'effet inhibiteur du fragment h- β TrCP Δ F. Les inhibiteurs potentiels sont ajoutés au milieu dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. On choisit dans les cellules stimulées au TNF ou à l'OKA, les inhibiteurs qui induisent une augmentation de l'expression du gène rapporteur.

Après avoir sélectionné des inhibiteurs dans les deux tests précédents, on peut vérifier dans un troisième test qu'ils sont capables d'inhiber l'activation de NF κ B induite par la stimulation des cellules au TNF ou à l'OKA.

On traite avec les inhibiteurs potentiels les cellules transfectées uniquement par 1 μ g de vecteur rapporteur (3Enh- κ B-ConA Luc) et stimulées pendant 6 h au TNF ou à l'OKA. Ces inhibiteurs, pour être spécifiques, ne devront avoir d'effet que sur les vecteurs rapporteurs dépendants de I κ B, et non sur les autres vecteurs rapporteurs (ConA ou RSV).

Pour la β -caténine, on pourra utiliser des cellules humaines provenant des lignées ci-dessus transformées avec la β -caténine mutée ou le fragment peptidique de β TrCP dépourvu de la boîte F en présence du vecteur Top-TK-Luci qui contient un multimère de sites TCF-LEF répondant à la β -caténine ou
 5 Fop-tk Luci qui contient un multimère muté inactif et qui ne répond plus à la β -caténine.

Détection de mutations de β -caténine

De plus, comme on peut aisément distinguer une β -caténine mutée
 10 oncogénique de la β -caténine sauvage par le fait que la première, contrairement à la seconde, est incapable de se lier à la β -TrCP en double-hybride, on peut détecter des mutations de la β -caténine dans les tumeurs humaines, par mesure en double-hybride de l'interaction avec la β -TrCP.

Ce test est intéressant: car on constate des mutations de la
 15 β -caténine dans de nombreux cancers, tels que cancer du colon, mélanome, hépatocarcinomes, etc. La seule manière de détecter ces mutations jusqu'à présent a été de séquencer la β -caténine à partir de RT-PCR sur l'ARN des tumeurs étudiées. Pour plus de sécurité, plusieurs séquences double brins doivent être faites dans ce test de l'art antérieur. De plus, l'existence d'une mutation ne signe
 20 pas en elle-même le caractère oncogénique de cette mutation. Il pourrait s'agir d'un polymorphisme sans aucun lien avec la tumorigénicité.

L'avantage du test double-hybride avec la protéine β -TrCP permet d'obtenir dans des délais équivalents à ceux nécessaires à l'obtention d'une séquence, une réponse claire quant au pourcentage de séquences oncogéniques
 25 mutées de la β -caténine détectées à partir de l'ARN tumoral. Sur un grand nombre de colonies, le pourcentage de formes oncogéniques de la β -caténine incapables d'interagir avec la β -TrCP, par rapport aux formes sauvages qui interagissent avec la β -TrCP, peut être déterminé précisément. Le test peut s'effectuer dans un temps équivalent à celui nécessaire pour l'obtention de quelques séquences, et pour un
 30 coût réduit.

Les étapes de ce test sont les suivantes :

- 1- Préparation de l'ARN total d'une biopsie d'une tumeur et du tissu sain environnant comme contrôle, par l'une des diverses techniques ou kits de préparation de l'ARN (AUSUBEL et al., Current protocols in Molecular Biology).
- 5 2- Amplification par RT-PCR à partir des échantillons ARN, des séquences β -caténine de la tumeur et du tissu sain environnant, en utilisant un couple d'oligonucléotides permettant l'amplification soit uniquement de la partie N-terminale (1-130) qui contient les mutations oncogéniques les plus fréquemment rencontrées (RUBINFELD, B. et al., Science, 275, 1790-1792, 1997 ;
10 DE LA COSTE et al., Proc. Natl.Acad.Sci. USA, 95, 8847-8851, 1998), soit de l'ensemble de la séquence codante de la β -caténine.
- 3- Insertion de ces fragments amplifiés par ligation dans un des vecteurs double-hybride, comme par exemple pGAD1318, de manière à obtenir une fusion en phase avec le domaine d'activation de la transcription de Gal4, ou du domaine
15 équivalent d'activation de la transcription ou de liaison à l'ADN codé par le vecteur double-hybride utilisé.
- 4- Transformation de bactéries de diverses souches appropriées et étalement de la totalité de la transformation sur milieu LB-ampicilline.
- 5- Recueil de l'ensemble des colonies et minipréparation de plasmide
20 (AUSUBEL, *supra*).
- 6- Des levures L40 ou toute autre souche de levure appropriée, seront cotransformées par le plasmide contenant les séquences β -caténine de la minipréparation ci-dessus avec un hybride de fusion contenant la β TrCP, par exemple pLexA- β TrCP, dans lequel la β TrCP est fusionnée au domaine de liaison
25 à l'ADN de LexA. Un essai double-hybride est effectué sur l'ensemble des colonies obtenues, par exemple par étalement des levures cotransformées sur milieu DO-W-L, puis transfert des colonies sur milieu sélectif pour la détection des interactions, c'est-à-dire milieu DO-W-L-H, ou en présence de X-Gal pour la détection des interactions par production de β -galactosidase (BARTEL P. &
30 FIELDS S., Meth. Enzymol., 254, 241-263, 1995).

Les réactifs nécessaires pour ce test sont les suivants :

1- Un vecteur pGAD1318 prédigéré aux sites appropriés pour insérer le fragment amplifié obtenu par RT-PCR.

2- Les oligonucléotides appropriés pour amplifier la séquence de la β -caténine et insérer ensuite les séquences β -caténine amplifiées. Les oligonucléotides amorces pour l'amplification seront choisis en fonction du mode d'insertion du fragment amplifié et des sites retenus.

3- Le plasmide pBTM116- β TrCP exprimant la β TrCP en fusion avec le domaine de liaison à l'ADN de LexA.

4- A titre de contrôle des plasmides codant pour des hybrides de fusion avec des protéines contrôles, par exemple pLexRas et pGAD1318Raf.

On pourra également, pour ce test, appliquer la technique de "Gap repair" (SCHWARTZ, H., et al. Mutation detection by a two-hybrid assay., Hum. Mol. Gen., 7, 1029-1032, 1998) pour insérer la séquence du fragment amplifié de la β -caténine dans le vecteur double-hybride et transformer directement des levures sans passer par l'étape de transformation préalable dans les bactéries.

L'invention va maintenant être décrite en détail à l'aide de l'exposé expérimental ci-après.

Une grande partie des techniques décrites dans ces exemples, bien connues de l'homme du métier, est exposée en détail dans l'ouvrage de SAMBROOK et al. (*supra*) ou dans l'ouvrage de AUSUBEL et al. (*supra*).

La description ci-après sera mieux comprise à l'aide des figures 1 à 12 sur lesquelles :

- la figure 1A est la photographie d'une boîte de Petri montrant la croissance de cellules de levure cotransformées par les plasmides contenant Vpu_C + VBP1 ; Vpu_C + h- β TrCP ; Vpu_{C-2/6} + h- β TrCP ; Vpu_C ; h- β TrCP + Vpu_C et h- β TrCP + CD4_C sur milieu en présence d'histidine (His+), sur milieu en l'absence d'histidine (His-) et sur milieu en présence du substrat de la β -galactosidase X-Gal (β -Gal) ;

- la figure 1B est la photographie d'un gel (Northern blot) montrant 3 ARNm de la protéine h- β TrCP de l'invention ;
- la figure 1C est la photographie d'un immunoblot montrant l'expression de la protéine h- β TrCP de l'invention ;
- 5 - la figure 2 donne les séquences de 4 protéines, h- β TrCP de l'invention et β TrCP1 de *Xenopus*, Met30p de *Saccharomyces cerevisiae* et Scon2p de *Neurospora crassa* ;
- la figure 3 est la photographie d'un gel SDS-PAGE 15% montrant l'interaction entre Vpu_C et la protéine h- β TrCP de l'invention produite *in vitro* ;
- 10 - la figure 4 est la photographie d'une boîte de Petri montrant la croissance de cellules de levure cotransformées par les plasmides contenant Skp1p + h- β TrCP ; Skp1p + h- β TrCP- Δ 7W ; Skp1p + VBP1 et Skp1p + CD4_C sur milieu en présence d'histidine (His+), sur milieu en l'absence d'histidine (His-) et sur milieu en présence du substrat de la β -galactosidase X-Gal (β -Gal) ;
- 15 - la figure 5 est une représentation schématique de la dégradation du récepteur CD4 induite par la protéine Vpu présentant le réseau d'interactions décrit précédemment ;
- la figure 6 est la photographie d'une boîte de Petri montrant la croissance de cellules de levure cotransformées par les plasmides contenant
- 20 β TrCP + I κ B α ; β -TrCP + I κ B α S32-36AA ; β TrCP + Raf ; Ras + I κ B α ; β TrCP + Vpuc et Ras + Raf sur milieu His+, sur milieu His- et l'expression de β -Gal ;
- la figure 7 est une représentation graphique montrant l'expression de la luciférase (exprimée en unités de lumière par μ g : RLU/ μ g de protéine) dans les cellules transfectées avec les constructions h- β TrCP et h- β TrCP Δ F et les
- 25 plasmides de contrôle et les vecteurs rapporteurs ci-après : 3Enh-KB-ConA luc ; ConA luc ; RSV luc ;
- la figure 8 est la photographie d'un immunoblot montrant la détection de la protéine I κ B phosphorylée ou non phosphorylée et la protéine h- β TrCP ou le fragment h- β -TrCP Δ F, en présence d'anticorps anti-I κ B α , anti-I κ B α -S32[®] et
- 30 anti-Myc ;

- la figure 9 est la photographie d'un immunoblot montrant la détection de la protéine IκB phosphorylée ou non phosphorylée avec la protéine h-βTrCP ou le fragment h-βTrCPΔF, en présence d'anticorps anti-IκBα-S32^(P) et anti-IκBα ;

5 - la figure 10 est la photographie d'une boîte de Petri montrant la croissance de cellules de levure cotransformées par les plasmides contenant βTrCP + βCat_{1→130} ; βTrCP + βCat_{1→130} S33-37AA ; βTrCP-2 + βCat_{1→130} ; βTrCP-2 + βCat_{1→130} S33-37AA et βTrCP + βCat sur milieu His+, sur milieu His- et l'expression β-Gal ;

10 - la figure 11 est une représentation graphique donnant l'expression de la luciférase (RLU/μg protéine) dans les cellules transfectées avec le plasmide pcDNA3, les plasmides contenant β-Cat ΔN, βTrCP, β-TrCPΔF, KIA 696 (β-TrCP-2) et KIA 696 ΔF (β-TrCP2ΔF) ;

15 - la figure 12 est la photographie d'un immunoblot montrant l'étude de la stabilité de la protéine β-caténine détectée avec des anticorps anti-βCat sous l'influence de l'expression de la protéine h-βTrCP ou du fragment h-βTrCPΔF détectés par l'anticorps anti-Myc.

Exemple 1 : Criblage double-hybride en levure / mise en évidence de la séquence d'ADNc de la protéine h-βTrCP et de la protéine h-βTrCP

20 On a choisi comme cible le domaine cytoplasmique de la protéine Vpu. On a procédé à la fusion des résidus d'acides aminés 28 à 81 de la protéine Vpu de l'isolat LAI de HIV-1 avec le domaine de fixation de l'ADN de Gal4 (Gal4BD). La banque d'ADNc criblée était celle des cellules Jurkat (lignée lymphocytaire T humaine, ATCC n°TIB 152) et elle a été fusionnée au domaine d'activation de
25 Gal4 (Gal4AD) dans le vecteur pGAD1318 (BENICHO et al. J. Biol. Chem., 269, 30073-30076, 1994).

Le clone de 1,3 kb qui a été isolé initialement par le système double-hybride (dénommé VBP1) code pour un ADN complémentaire partiel. Cet ADNc partiel code pour un fragment de 319 acides aminés correspondant au domaine
30 C-terminal de la protéine h-βTrCP. Il contient sept motifs répétitifs suivis d'une

queue C-terminale de 24 acides aminés. Ces motifs répétitifs, qui sont connus, sont dénommés motifs WD parce que leur extrémité se termine habituellement par la séquence Trp-Asp (WD). On notera que les motifs WD sont impliqués dans des interactions protéine-protéine (NEER et al., *Nature*, 371, 297-300, 1994).

5 Le clone ainsi isolé a été caractérisé par séquençage d'ADN sur séquenceur automatisé Applied Biosystem connu sous la dénomination ABI 373A. La technique de séquençage d'ADN est bien connue de l'homme du métier et est décrite notamment dans l'ouvrage SAMBROOK et al., "Molecular Cloning : a Laboratory Manual" Ed. Cold Spring Harbor Press, NY, 1989.

10 Une recherche dans les banques d'ADNc a montré que ce clone est l'homologue d'une séquence codant pour la protéine β TrCP de *Xenope* identifiée préalablement par SPEVAK et al. (*Mol. Cell. Biol.*, 13, 4953-4966, 1993).

L'ADNc complet (2,1 kb) de la protéine h- β TrCP, qui a la SEQ ID No. 1, a été obtenu par la technique de polymérisation en chaîne (PCR) sur une préparation de
15 plasmide correspondant à la banque d'ADN complémentaires de cellules Jurkat, telles que définies précédemment, dans le vecteur pGAD1318.

En plus des sept motifs WD identifiés dans le fragment C-terminal, la protéine h- β TrCP entière selon l'invention possède un domaine N-terminal d'environ 250 acides aminés. Le fragment N-terminal contient un motif pour lequel un consensus
20 a été récemment défini sous le terme de boîte F et dont le rôle serait de cibler des protéines vers la machinerie de dégradation des protéines médiée par l'ubiquitine grâce à l'interaction de protéines contenant cette boîte F avec la protéine Skp1p (BAI et al., 1996, *supra*).

Ainsi la protéine h- β TrCP, par ses motifs WD, est d'une part capable d'interagir
25 avec la protéine Vpu, et d'autre part possède un motif boîte F qui interagit avec la protéine Skp1p et est donc capable de cibler les protéines vers les voies de dégradation par le protéasome.

La protéine h- β TrCP possède 569 acides aminés et comprend une boîte F et sept motifs WD dont la position dans la séquence SEQ ID N° 2 est la suivante :

- boîte F : acides aminés 147-191,
- premier motif WD : acides aminés 259-292,
- deuxième motif WD : acides aminés 304-332,
- troisième motif WD : acides aminés 343-372,
- 5 - quatrième motif WD : acides aminés 387-415,
- cinquième motif WD : acides aminés 427-455,
- sixième motif WD : acides aminés 467-492,
- septième motif WD : acides aminés 516-544.

On a recherché si la protéine ainsi isolée avait une quelconque homologie avec
 10 des protéines déjà connues en utilisant la technique, bien connue de l'homme du
 métier, d'alignement des séquences selon le programme de MACAW (SCHULER
 et al., Proteins : structure, function and genetics, 9, 180-190, 1991).

Les résultats obtenus sont reportés sur la figure 2 qui montre que la protéine
 h- β TrCP a une homologie :

- 15 • de 88% avec la protéine x- β TrCP1 de *Xenopus*,
- de 33% avec la protéine Met30p de *Saccharomyces cerevisiae*, inhibiteur de
 transcription impliqué dans la biosynthèse,
- de 31% avec la protéine Scon2p de *Neurospora crassa*.

La figure 2 montre également l'emplacement de la boîte F et des motifs WD.

20

Exemple 2 : Clonage de l'ADNc de la protéine h- β TrCP

L'ADNc de la protéine h- β TrCP ayant la SEQ ID N° 1 a été amplifié par
 PCR à partir de 2 μ g d'ADN du plasmide de la banque d'ADNc pGAD en utilisant
 deux tours d'amplification, le couple externe d'amorces pour le premier tour étant
 25 constitué de l'amorce sens A ayant la SEQ ID N° 3 (dans pGAD1318) et de
 l'amorce antisens B ayant la SEQ ID N° 4 (dans VPB1) et le couple interne
 d'amorces pour le deuxième tour étant constitué de l'amorce sens C ayant la
 SEQ ID N° 5 (dans pGAD1318) et de l'amorce antisens D ayant la SEQ ID N° 6
 (dans VPB1).

A la suite de cette procédure, on a isolé un fragment de 1,4 kb, souscloné dans le plasmide pGAD-VBP1 sous la forme d'un fragment 5'Spe1-3'BglIII, pour reconstituer le clone pGAD-h- β TrCP.

Les séquences codant pour VBP1 (résidus d'acides aminés 251 à 569 de la protéine h- β TrCP) ou codant pour la protéine h- β TrCP entière ont été sousclonées dans les vecteurs pGBT9, pGEX4T2 (Pharmacia) ou pCDNA3 (uniquement pour la protéine h- β TrCP) (Invitrogen) en utilisant des procédures standards.

Exemple 3 : Interaction spécifique de la protéine Vpu avec la protéine h- β TrCP

Les résultats expérimentaux qui démontrent l'interaction spécifique de la nouvelle protéine humaine β TrCP avec la protéine Vpu sont illustrés sur la figure 1.

3a- Interaction entre la protéine Vpu et la protéine h- β TrCP par le crible double-hybride décrit précédemment.

La figure 1A démontre l'interaction, par la technique double-hybride, de la région C-terminale de la protéine h- β TrCP (VBP1) issue de la banque d'ADNc de cellules Jurkat (ligne 1) ou de la protéine h- β TrCP entière (ligne 2) fusionnée au domaine d'activation de Gal4, avec le domaine cytoplasmique de Vpu fusionné au domaine de liaison à l'ADN de Gal4 ou vice-versa (ligne 5). L'interaction se manifeste par l'activation des deux gènes rapporteurs His3 et LacZ ; le gène His3 permet la pousse des levures en l'absence d'histidine (panneau -His), et le gène LacZ induit la production de β -galactosidase manifestée par la coloration bleue en présence du substrat X-Gal (panneau β -Gal). Cette interaction est spécifique puisqu'elle n'est pas retrouvée entre la protéine Vpu et le vecteur seul (ligne 4), ou entre la protéine h- β TrCP et une autre protéine telle la région cytoplasmique de CD4 (ligne 6). Le panneau + His est un panneau contrôle qui montre que toutes les combinaisons, y compris lorsqu'il n'y a pas d'interaction, poussent en présence d'histidine.

Il faut noter que la protéine h- β TrCP n'interagit pas avec un mutant de la protéine Vpu inactif, Vpuc-2/6 (ligne 3), clone muté sur les deux résidus sérine Ser 52 et Ser 56, qui sont essentiels pour l'activité de Vpu (MARGOTTIN et al,

1996, *supra*). Ce résultat démontre qu'il y a corrélation entre la capacité de Vpu à interagir avec la h-βTrCP et son activité.

3b- Mise en évidence de l'expression de la protéine h-βTrCP par analyse "Northern Blot".

5 Par analyse "Northern Blot" d'ARNm de différentes lignées cellulaires humaines en utilisant une sonde 5', on a trouvé que plusieurs ARN messagers (ARNm) hybrident avec une sonde correspondant à h-βTrCP (Fig. 1B). Ces ARNm de tailles respectives 2,4 kb, 3,5 kb et 7 kb, sont retrouvés dans tous les
10 tissus humains testés. Cette multiplicité d'ARNm est réminiscente de la situation décrite par HUDSON et al. (Dev. Genet., 19, 190-198, 1996) pour les ARNm de la βTrCP de *Xenope*, pour laquelle 3 ARNm différents de tailles respectives voisines de celles trouvées ici pour les ARNm de la h-βTrCP ont été rapportés.

3c- Mise en évidence de l'expression de la protéine h-βTrCP par analyse "Immunoblot".

15 Des anticorps anti-peptidiques anti-h-βTrCP (Abs) ont été produits chez des lapins par immunisation avec le peptide de synthèse 275-293 correspondant au premier motif WD de la protéine h-βTrCP. Ces anticorps Abs ont été purifiés par affinité par adsorption sur 30 µg de la protéine de fusion GST-VBP1, exprimée chez *E. Coli* à partir du vecteur pGEX-VBP1 et immobilisée après
20 électrobuvarage sur une membrane de nitrocellulose. Les anticorps Abs purifiés ont ensuite été élués par l'éluant glycine.HCl, pH 3,0, neutralisés avec du tampon 1M TRIS, pH 8,0, et utilisés pour une analyse, par la technique de Western blot, de l'expression de la protéine h-βTrCP dans les cellules humaines Sup T1 (T1), dans les réticulocytes de lapins (RRL) et dans les lysats de membrane
25 microsomique canine (CMM).

La Figure 1C montre l'expression de la protéine h-βTrCP détectée dans un lysat de cellules T humaines de la lignée Sup T1 (ligne 1), de réticulocytes de lapin de Promega (ligne 3), par la technique "Western blot" en utilisant les anticorps anti-h-βTrCP dirigés contre le peptide 275-293 obtenus précédemment. En revanche
30 aucune protéine correspondant à la h-βTrCP n'a pu être détectée dans des membranes de microsomes de pancréas de chien de Promega (ligne 2). La taille de

la protéine h-βTrCP détectée (60 kD) indique que le clone d'ADNc de h-βTrCP qui a été caractérisé et qui est représenté sur la figure 2 est capable de coder pour la protéine h-βTrCP entière.

5 Exemple 4 : Cartographie des sites d'interaction entre Vpuc et la protéine h-βTrCP

Les sites d'interaction entre le domaine cytoplasmique de la protéine Vpu (Vpuc) et la protéine h-βTrCP de l'invention ont été déterminés de la façon suivante.

10 Au niveau de Vpuc, il a été montré que la mutation des sérines aux positions 52 et 56 (clone Vpuc-2/6) abolissait intégralement l'interaction entre Vpu et h-βTrCP.

Au niveau de h-βTrCP, les résultats d'interaction double-hybride avec le domaine cytoplasmique de Vpu et les différents mutants décrits ci-après montrent que l'ensemble des motifs WD et la queue C-terminale sont requis pour une
15 interaction optimale, comme indiqué dans le tableau ci-après.

Les mutants utilisés sont les suivants :

- VPB1-ΔW₁ (clone VPB1 dont le premier domaine WD a été délété ; résidus 292 à 569), qui correspondent à un fragment BglII-Xho1 de VBP1,
- VPB1-ΔW₄₋₇ (clone VPB1 dont les domaines WD 4 à 7 ont été délétés ; résidus
20 292 à 396), et
- VPB1-ΔC-ter (clone VPB1 dont la queue C-terminale après le 7^{ème} domaine WD a été délétée ; résidus 292 à 545)

par PCR en utilisant respectivement l'amorce sens C, décrite précédemment, et les amorces antisens E et F suivantes dans VBP1.

25 Amorce E : SEQ ID N° 7

Amorce F : SEQ IND N° 8.

Le mutant h-βTrCP-Δ7W (clone h-βTrCP dont les sept domaines WD ont été délétés ; résidus 1 à 291) a été construit en insérant un fragment SpeI-BglII à partir de la protéine h-βTrCP dans le vecteur pGAD1318 et le mutant βTrCPΔF

(résidus délétés : 32 à 179) a été obtenu par délétion du fragment AvrII-Asp718 de la protéine h-βTrCP avec conservation du cadre de lecture.

On a vérifié que l'interaction entre les protéines Vpu et h-βTrCP pouvait avoir lieu *in vitro* par le procédé suivant : les deux protéines ont été introduites dans du
5 lysat de réticulocytes de lapins (RRL). Les complexes Vpu/βTrCP formés *in vitro* ont été identifiés par co-immunoprécipitation en utilisant des anticorps anti-h-βTrCP dirigés contre le peptide 553-569, préparés par le même procédé que celui utilisé pour obtenir les anticorps anti-h-βTrCP dirigés contre le peptide 275-293.

10 La figure 3 illustre l'interaction *in vitro* entre les protéines Vpu et h-βTrCP. La ligne 1 montre que la protéine Vpu n'est pas reconnue par l'antisérum anti-h-βTrCP, tandis que la ligne 5 montre qu'elle précipite en présence d'un antisérum anti-Vpu. La ligne 2 montre que les anticorps anti-h-βTrCP sont capables de coprécipiter la protéine Vpu co-traduite *in vitro* avec la protéine
15 h-βTrCP. La ligne 4 montre que le double mutant de Vpu muté sur les positions Ser52 et Ser56, incapable d'induire la dégradation de CD4, n'interagit pas avec la protéine h-βTrCP, et n'est donc pas coprécipité par des anticorps anti-h-βTrCP, tandis que les lignes 6 et 7 montrent que ce mutant Vpu_{C-2/6} est traduit avec la même efficacité que la protéine Vpu.

TABLEAU

Mutants à délétion de h- β TrCP	Interaction avec Vpuc
h- β TrCP: — F — ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ —	+++
VBP1: — ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ —	+++
VBP1- Δ W1: ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ —	-
VBP1- Δ C-ter: — ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ —	+
VBP1- Δ W4-7: — ① ② ③ —	+
h- β TrCP- Δ 7W: — F —	-

Exemple 5 : Interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine Skp1p

Afin de démontrer que le motif boîte F était bien fonctionnel et pouvait donc effectivement servir au ciblage vers le protéasome par l'intermédiaire de la protéine Skp1p, on a réalisé un test double-hybride entre le domaine N-terminal de la protéine h- β TrCP et la protéine Skp1p, ce qui a permis de mettre en évidence

5 une interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine Skp1p.

La protéine humaine Skp1p décrite dans BAI et al. (1996, *supra*) a été sousclonée dans le vecteur pLex10 pour une analyse d'interaction avec la protéine h- β TrCP dans la souche de levure L40 (VOJTEK et al. Cell, 74, 205-214, 1993).

10 La figure 4 illustre les résultats obtenus. La ligne 1 de la figure 4 montre tout d'abord que la protéine h- β TrCP interagit avec la protéine Skp1p. La ligne 2 montre que le domaine N-terminal suffit à obtenir l'interaction, alors que la ligne 3 montre que l'absence du domaine N-terminal de la protéine h- β TrCP dans VBP1 fait perdre toute interaction avec la protéine Skp1p. Ces résultats sont des

15 arguments supplémentaires importants en faveur d'un rôle de la protéine h- β TrCP dans la dégradation médiée par la protéine Vpu du récepteur CD4, et également corroborent les résultats de FUJITA et al. (1997, *supra*) et de SCHUBERT et al. (1997, *supra*) montrant que la dégradation du récepteur CD4 induite par la protéine Vpu devrait avoir lieu dans le protéasome. Il est à noter que le domaine

20 cytoplasmique de CD4 est incapable de se lier directement à la protéine Skp1 (ligne 4).

Exemple 6 : Modèle du réseau d'interactions impliqué dans la dégradation du récepteur CD4

25 La dégradation du récepteur CD4 induite par la protéine Vpu est effectuée par le réseau d'interactions a) entre la protéine Vpu et le récepteur CD4, b) entre la protéine Vpu et les motifs WD de la protéine h- β TrCP et c) entre la boîte F de la protéine h- β TrCP et la protéine Skp1p, cette dernière interaction permettant d) le ciblage du complexe Vpu/CD4 vers le protéasome.

30 Ce réseau d'interactions est illustré schématiquement sur la figure 5.

C'est par l'intermédiaire d'un tel réseau d'interactions que la dégradation du récepteur CD4 par le protéasome via la protéine Vpu est provoquée.

La dégradation du récepteur CD4 permet la libération de la protéine d'enveloppe Gp160 et donc la libération du virus HIV-1 infectieux.

- 5 Un des moyens pour empêcher le développement du virus HIV-1 chez le patient atteint consiste donc à empêcher la dégradation du récepteur CD4. Un des moyens pour empêcher cette dégradation au vu du procédé de dégradation ci-dessus consiste à rechercher des inhibiteurs, ou agents antiviraux anti-HIV, inhibant l'interaction soit entre la protéine Vpu et la protéine h- β TrCP, soit entre
- 10 la protéine h- β TrCP et la protéine Skp1p par les procédés décrits précédemment.

Exemple 7 : Interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine I κ B

- Pour ce test double-hybride en levure, on a fusionné les protéines décrites ci-dessous, soit au domaine d'activation de la transcription de Gal4 (Gal4D), soit au
- 15 domaine de liaison de l'ADN de LexA :

- β TrCP = protéine humaine β TrCP de la présente invention,
- I κ B α ,
- I κ B α S32-36A = mutant de I κ B α au niveau des sérines S32 et S36 de sorte qu'il n'y a pas phosphorylation,
- 20 - Ras = protéine contrôle,
- Raf = protéine contrôle,
- Vpuc = protéine Vpu cytoplasmique telle que décrite précédemment.

Les résultats expérimentaux qui démontrent l'interaction spécifique de la nouvelle protéine humaine β TrCP avec la protéine I κ B sont illustrés sur la figure 6.

- 25 Grâce à ce test double-hybride, il est montré que :
- les deux protéines h- β TrCP et I κ B sont capables d'interagir,
 - l'interaction h- β TrCP/I κ B est spécifique des deux hybrides puisque, lorsque l'un des deux hybrides est remplacé par un hybride avec une autre protéine telle que Gal4AD-Raf ou LexABD-Ras, il n'y a plus d'interaction, alors que ces deux
 - 30 hybrides contrôles sont capables d'interagir, et

- cette interaction est perdue quand les résidus sérines S32 et S36 de la protéine I κ B sont mutés en résidus non phosphorylables comme Alanine.

Dans ce test, on a également observé une interaction entre la protéine VPU du virus HIV-1 et la protéine h- β TrCP.

5

Exemple 8 : Interaction I κ B/h- β TrCP en cellules humaines : modulation de l'activation transcriptionnelle de gènes rapporteurs de l'activité NF κ B par l'expression de la protéine h- β TrCP ou de son fragment h- β TrCP Δ F

Dans des cellules non stimulées (NS) de la lignée cellulaire 293, la protéine
10 β TrCP humaine ou le fragment h- β TrCP Δ F sont exprimés transitoirement à partir d'un vecteur d'expression eucaryote tel que pCDNA3 (Invitrogen), ayant inséré l'ADNc codant pour la protéine h- β TrCP sous le contrôle d'un promoteur du cytomégalo virus fort (CMV). Une quantité de 3 μ g de ce plasmide, qui permet l'expression de la protéine h- β TrCP ou du fragment h- β TrCP Δ F, est cotransfectée
15 par lipofectamine (Life technologies), avec 1 μ g d'un vecteur rapporteur dépendant (3Enh- κ B-ConA Luc) ou indépendant (RSV Luc ou ConA Luc) de sites NF κ B qui contrôlent l'expression du gène rapporteur luciférase.

Les résultats obtenus (Figure 7) montrent que le fragment h- β TrCP Δ F est capable d'agir comme un transdominant négatif. Le fragment h- β TrCP Δ F inhibe
20 par compétition avec la β TrCP endogène, l'activation de NF κ B induite par le TNF ou l'acide okadaïque (OKA). Cette activation de NF κ B est mesurée par l'activité d'un gène rapporteur sous le contrôle d'un promoteur qui a trois sites de fixation à NF κ B (3Enh- κ B-ConA Luc) (Arenzana et al., 1993, J. Virol., 67, 6596-6609). En revanche, la protéine h- β TrCP a un effet activateur sur l'activation de NF κ B. La
25 protéine h- β TrCP ou le fragment h- β TrCP Δ F n'ont aucun effet sur la transcription d'un gène rapporteur dirigé par un promoteur ne contenant pas de sites NF κ B (RSV Luc) (Invitrogen).

Exemple 9 : Utilisation d'anticorps spécifiques pour la mise en évidence de l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine I κ B endogène des cellules 293 ou Hela, et de ses conséquences sur la stabilité de la protéine I κ B

La stabilité des formes phosphorylées d'I κ B a été analysée dans des cellules 293 transfectées par un plasmide contrôle, par un plasmide pcDNA (Invitrogen) exprimant la protéine h- β TrCP ou par un plasmide pcDNA exprimant le fragment h- β TrCP Δ F, la protéine h- β TrCP et le fragment h- β TrCP Δ F ayant été fusionnés à l'épitope myc en C-terminal de ce vecteur pcDNA. Après 36 heures, on a stimulé les cellules 293 avec du TNF en présence de 100 μ g/ml de cycloheximide (inhibiteur de la synthèse protéique). On a séparé les protéines cytoplasmiques en gel polyacrylamide dénaturant au SDS, puis on les a transférées sur une membrane de nitrocellulose et incubées, soit avec l'anticorps monoclonal 10B dirigé contre la partie amino-terminale d'I κ B et reconnaissant toutes les formes de la protéine (α -I κ B α ; JAFFRAY et al., Mol. Cell. Biol., 15, 2166-2172, 1995), soit avec un anticorps polyclonal reconnaissant spécifiquement les formes phosphorylées d'I κ B (α -I κ B α -S32^P ; 9241S, New England Biolabs), soit avec un anticorps monoclonal anti-myc dirigé contre l'épitope myc fusionné à h- β TrCP et h- β TrCP Δ F et montrant l'expression de ces derniers dans les cellules transfectées (α -Myc ; SC40AC, Santa Cruz), en réalisant un Western blot (WB).

Les résultats obtenus (figure 8) montrent que l'expression du mutant h- β TrCP Δ F s'accompagne de l'inhibition de la dégradation de I κ B normalement induite par le TNF. Sous l'influence de l'expression de h- β TrCP Δ F, les formes phosphorylées s'accumulent, comme montré par la réactivité des anticorps α -I κ B α -S32^P (panneau de droite).

La protéine h- β TrCP, au contraire, active la dégradation de I κ B α (panneau du milieu). Le panneau inférieur concernant l'anticorps α -Myc est un panneau témoin qui montre l'expression des protéines h- β TrCP et h- β TrCP Δ F.

On a également confirmé l'interaction h- β TrCP-I κ B par une expérience d'immunoprécipitation.

Pour ce faire, on a transfecté des cellules Hela avec un plasmide pcDNA contrôle exprimant la β -galactosidase (β -Gal), la protéine h- β TrCP (β TrCP) ou le mutant h- β TrCP Δ F (β TrCP Δ F), h- β TrCP et h- β TrCP Δ F ayant été fusionnés avec un épitope myc en C-terminal. Après 36 heures, on a stimulé les cellules Hela pendant 15 minutes par le TNF en présence d'inhibiteurs du protéasome (z-LLL-H) (PALOMBELLA, V. et al., Cell, 78, 773-789, 1994) (z-LLL-H + TNF ; réaction +), ou laissées sans stimulation (réaction -). On a ensuite procédé soit à un immunoblot direct après séparation des protéines du lysat cellulaire par gel dénaturant SDS et transfert sur une membrane de nitrocellulose incubée avec des anticorps α -I κ B α -S32^P (panneau supérieur), soit à une immunoprécipitation avec des anticorps α -Myc suivie d'un immunoblot comme indiqué ci-dessus avec l'anticorps α -I κ B α -S32^P ou l'anticorps α -I κ B α .

Les résultats sont indiqués sur la figure 9, sur laquelle le panneau supérieur reprend les résultats uniquement du Western blot et les deux panneaux inférieurs ceux de l'immunoprécipitation-Western blot, et le panneau de droite donne le patron de migration des formes phosphorylées induites par le traitement au TNF sur des cellules Hela contrôles.

La figure 9 montre, par des expériences de co-immunoprécipitation de la protéine h- β TrCP ou du fragment h- β TrCP Δ F fusionnés avec l'épitope myc, que seule la forme phosphorylée de I κ B α et non la forme non phosphorylée, est associée à la protéine h- β TrCP (colonne 4). Cette association est surtout révélée grâce à l'inhibition de la dégradation induite par le mutant h- β TrCP Δ F (colonnes 5 et 6), et à l'utilisation d'inhibiteurs du protéasome (z-LLL-H).

25

Exemple 10 : Interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine β -caténine

Pour ce test double-hybride, on a fusionné les ADNc codant pour les protéines décrites ci-dessous, soit au domaine d'activation de la transcription de Gal4 (Gal4AD), soit au domaine de liaison à l'ADN de LexA (LexABD) :

30 - β TrCP = protéine humaine β TrCP de la présente invention,

- KIAA0696 (β TrCP-2) = protéine humaine β TrCP isolée par ISHIKAWA et al. (DNA Research, 5, 169-176, 1998),
 - β Cat_{1→130} = protéine β -caténine normale (domaine N-terminal ; 1→130),
 - β Cat_{1→130} S33-37AA = protéine β -caténine oncogène mutée sur les résidus
- 5 sérine S33 et S37 de sorte qu'il n'y a pas phosphorylation,
- β Cat = protéine β -caténine normale entière,

Les résultats expérimentaux qui démontrent qu'il existe une interaction spécifique de la nouvelle protéine humaine β TrCP avec la protéine β -caténine sont illustrés sur la figure 10.

- 10 Grâce à ce test double-hybride, il est montré que :
- les deux protéines h- β TrCP et β Cat_{1→130} sont capables d'interagir,
 - l'interaction h- β TrCP/ β Cat_{1→130} est perdue quand les résidus sérine S33 et S37 sont mutés en résidus non phosphorylables (β -caténine oncogène), et
 - la β TrCP-2 n'est pas capable de réagir ni avec la β -caténine non mutée, ni
- 15 avec la β -caténine mutée.

Il est à noter qu'on observe également une interaction, entre la protéine β -caténine entière et la protéine h- β TrCP.

20 Exemple 11 : Activation de la transcription du gène rapporteur TCF/LEF par expression de la β -caténine mutée ou de h- β TrCP Δ F dans les cellules humaines 293.

On a transfecté des cellules HEK 293 avec le vecteur rapporteur Top-TK-Luci, qui contient un multimère de sites TCF-LEF ou le vecteur rapporteur Fop-TK-Luci, qui contient un multimère contrôle inactif de sites TCF-LEF. Ces

25 constructions sont cotransfectées avec le vecteur d'expression pCDNA3 (Invitrogen), soit vide comme contrôle, soit exprimant un fragment oncogénique de la β -caténine, à savoir la β -caténine dépourvue de la partie N-terminale β -cat Δ N, soit exprimant la protéine h- β TrCP ou le fragment β TrCP Δ F. L'activité luciférase est mesurée 24 h après la transfection et normalisée

à une activité Renilla Luciférase contrôle obtenue par co-transfection de cellules avec le vecteur RSV-Renilla (Promega).

Les résultats obtenus, qui figurent sur la figure 11, montrent que le fragment h- β TrCP Δ F induit une activation d'un gène rapporteur contrôlé par un promoteur TCF/LEF, qui répond à des modifications de niveau d'expression de la β -caténine (Morin P.J. et al. 1997, Science, 275, 1787-1790). Ceci indique que la dégradation de la β -caténine est inhibée par expression du mutant h- β TrCP Δ F. Par contre, en ce qui concerne la protéine KIAA 0696 β -TrCP2 dans le même système de gène rapporteur, l'effet positif induit par le KIAA 0696 Δ F (β TrCP2 Δ F) est beaucoup plus faible que celui obtenu avec la construction équivalente β TrCP Δ F.

L'ensemble de ces résultats démontrent donc que c'est la protéine h- β TrCP de l'invention, et non la protéine KIAA 0696, qui est le médiateur de la dégradation de la β -caténine.

Exemple 12 : Etude de l'expression de la protéine h- β TrCP ou du fragment h- β TrCP Δ F sur la stabilité de la β -caténine endogène des cellules Hela

On a transfecté des cellules Hela avec les quantités d'ADN indiquées sur la figure 12, exprimant soit la protéine h- β TrCP, soit le fragment h- β TrCP Δ F fusionnés à l'épitope myc en C-terminal dans un vecteur pcDNA (Invitrogen). Après 24 heures, on a lysé les cellules et on a séparé les protéines cellulaires sur gel de polyacrylamide dénaturant SDS, on les a transférées sur membrane de nitro-cellulose et on les a incubées soit avec un anticorps anti- β -caténine (α - β Cat), soit avec un anticorps anti-myc pour la détection de l'expression de la protéine h- β TrCP ou du fragment h- β TrCP Δ F (α -Myc) en réalisant un Western blot (WB).

Les résultats sont indiqués sur la figure 12 et montrent que l'expression de la h- β TrCP augmente la dégradation de la β -caténine (colonne du milieu), alors que l'expression du mutant h- β TrCP Δ F inhibe la dégradation de la β -caténine et conduit à son accumulation dans les cellules (colonne de droite).

Il est à noter que, dans la colonne C, on montre un contrôle de cellules Hela non transfectées ; et l'astérisque indique, par le marquage non spécifique d'une

protéine cellulaire du lysat de cellules Hela que, approximativement, la même quantité de protéines cellulaires a été déposée dans toutes les pistes.

Les résultats corroborent ceux montrés dans l'exemple précédent.

LISTE DE SEQUENCES

(1) INFORMATIONS GENERALES:

(i) DEPOSANT:

- (A) NOM: INSERM
- (B) RUE: 101, Rue de Tolbiac
- (C) VILLE: PARIS
- (E) PAYS: FRANCE
- (F) CODE POSTAL: 75654 Cédex13

(ii) TITRE DE L'INVENTION: Protéine humaine β TrCP de ciblage des protéines vers les voies de dégradation par le protéasome

(iii) NOMBRE DE SEQUENCES: 8

(iv) FORME DECHIFFRABLE PAR ORDINATEUR:

- (A) TYPE DE SUPPORT: Floppy disk
- (B) ORDINATEUR: IBM PC compatible
- (C) SYSTEME D' EXPLOITATION: PC-DOS/MS-DOS
- (D) LOGICIEL: PatentIn Release #1.0, Version #1.30 (OEB)

(2) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 1:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:

- (A) LONGUEUR: 2151 paires de bases
- (B) TYPE: nucléotide
- (C) NOMBRE DE BRINS: simple
- (D) CONFIGURATION: linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE: ADNc

(ix) CARACTERISTIQUE:

- (A) NOM/CLE: CDS
- (B) EMBLACEMENT: 70..1776

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO: 1:

TGCGTTGGCT GCGGCCTGGC ACCAAAGGGG CGGCCCCGGC GGAGAGCGGA CCCAGTGGCC	60
TCGGCGATT ATG GAC CCG GCC GAG GCG GTG CTG CAA GAG AAG GCA CTC	108
Met Asp Pro Ala Glu Ala Val Leu Gln Glu Lys Ala Leu	
1 5 10	
AAG TTT ATG AAT TCC TCA GAG AGA GAA GAC TGT AAT AAT GGC GAA CCC	156
Lys Phe Met Asn Ser Ser Glu Arg Glu Asp Cys Asn Asn Gly Glu Pro	
15 20 25	
CCT AGG AAG ATA ATA CCA GAG AAG AAT TCA CTT AGA CAG ACA TAC AAC	204
Pro Arg Lys Ile Ile Pro Glu Lys Asn Ser Leu Arg Gln Thr Tyr Asn	
30 35 40 45	
AGC TGT GCC AGA CTC TGC TTA AAC CAA GAA ACA GTA TGT TTA GCA AGC	252
Ser Cys Ala Arg Leu Cys Leu Asn Gln Glu Thr Val Cys Leu Ala Ser	
50 55 60	
ACT GCT ATG AAG ACT GAG AAT TGT GTG GCC AAA ACA AAA CTT GCC AAT	300
Thr Ala Met Lys Thr Glu Asn Cys Val Ala Lys Thr Lys Leu Ala Asn	
65 70 75	

GGC	ACT	TCC	AGT	ATG	ATT	GTG	CCC	AAG	CAA	CGG	AAA	CTC	TCA	GCA	AGC	348
Gly	Thr	Ser	Ser	Met	Ile	Val	Pro	Lys	Gln	Arg	Lys	Leu	Ser	Ala	Ser	
		80					85					90				
TAT	GAA	AAG	GAA	AAG	GAA	CTG	TGT	GTC	AAA	TAC	TTT	GAG	CAG	TGG	TCA	396
Tyr	Glu	Lys	Glu	Lys	Glu	Leu	Cys	Val	Lys	Tyr	Phe	Glu	Gln	Trp	Ser	
	95					100					105					
GAG	TCA	GAT	CAA	GTG	GAA	TTT	GTG	GAA	CAT	CTT	ATA	TCC	CAA	ATG	TGT	444
Glu	Ser	Asp	Gln	Val	Glu	Phe	Val	Glu	His	Leu	Ile	Ser	Gln	Met	Cys	
110					115					120					125	
CAT	TAC	CAA	CAT	GGG	CAC	ATA	AAC	TCG	TAT	CTT	AAA	CCT	ATG	TTG	CAG	492
His	Tyr	Gln	His	Gly	His	Ile	Asn	Ser	Tyr	Leu	Lys	Pro	Met	Leu	Gln	
				130					135					140		
AGA	GAT	TTC	ATA	ACT	GCT	CTG	CCA	GCT	CGG	GGA	TTG	GAT	CAT	ATC	GCT	540
Arg	Asp	Phe	Ile	Thr	Ala	Leu	Pro	Ala	Arg	Gly	Leu	Asp	His	Ile	Ala	
			145					150						155		
GAG	AAC	ATT	CTG	TCA	TAC	CTG	GAT	GCC	AAA	TCA	CTA	TGT	GCT	GCT	GAA	588
Glu	Asn	Ile	Leu	Ser	Tyr	Leu	Asp	Ala	Lys	Ser	Leu	Cys	Ala	Ala	Glu	
	160						165					170				
CTT	GTG	TGC	AAG	GAA	TGG	TAC	CGA	GTG	ACC	TCT	GAT	GGC	ATG	CTG	TGG	636
Leu	Val	Cys	Lys	Glu	Trp	Tyr	Arg	Val	Thr	Ser	Asp	Gly	Met	Leu	Trp	
	175					180					185					
AAG	AAG	CTT	ATC	GAG	AGA	ATG	GTC	AGG	ACA	GAT	TCT	CTG	TGG	AGA	GGC	684
Lys	Lys	Leu	Ile	Glu	Arg	Met	Val	Arg	Thr	Asp	Ser	Leu	Trp	Arg	Gly	
190					195					200					205	
CTG	GCA	GAA	CGA	AGA	GGA	TGG	GGA	CAG	TAT	TTA	TTC	AAA	AAC	AAA	CCT	732
Leu	Ala	Glu	Arg	Arg	Gly	Trp	Gly	Gln	Tyr	Leu	Phe	Lys	Asn	Lys	Pro	
				210				215						220		
CCT	GAC	GGG	AAT	GCT	CCT	CCC	AAC	TCT	TTT	TAT	AGA	GCA	CTT	TAT	CCT	780
Pro	Asp	Gly	Asn	Ala	Pro	Pro	Asn	Ser	Phe	Tyr	Arg	Ala	Leu	Tyr	Pro	
			225					230					235			
AAA	ATT	ATA	CAA	GAC	ATT	GAG	ACA	ATA	GAA	TCT	AAT	TGG	AGA	TGT	GGA	828
Lys	Ile	Ile	Gln	Asp	Ile	Glu	Thr	Ile	Glu	Ser	Asn	Trp	Arg	Cys	Gly	
	240					245						250				
AGA	CAT	AGT	TTA	CAG	AGA	ATT	CAC	TGC	CGA	AGT	GAA	ACA	AGC	AAA	GGA	876
Arg	His	Ser	Leu	Gln	Arg	Ile	His	Cys	Arg	Ser	Glu	Thr	Ser	Lys	Gly	
	255					260					265					
GTT	TAC	TGT	TTA	CAG	TAT	GAT	GAT	CAG	AAA	ATA	GTA	AGC	GGC	CTT	CGA	924
Val	Tyr	Cys	Leu	Gln	Tyr	Asp	Asp	Gln	Lys	Ile	Val	Ser	Gly	Leu	Arg	
270					275					280					285	
GAC	AAC	ACA	ATC	AAG	ATC	TGG	GAT	AAA	AAC	ACA	TTG	GAA	TGC	AAG	CGA	972
Asp	Asn	Thr	Ile	Lys	Ile	Trp	Asp	Lys	Asn	Thr	Leu	Glu	Cys	Lys	Arg	
				290					295					300		
ATT	CTC	ACA	GGC	CAT	ACA	GGT	TCA	GTC	CTC	TGT	CTC	CAG	TAT	GAT	GAG	1020
Ile	Leu	Thr	Gly	His	Thr	Gly	Ser	Val	Leu	Cys	Leu	Gln	Tyr	Asp	Glu	
			305					310					315			
AGA	GTG	ATC	ATA	ACA	GGA	TCA	TCG	GAT	TCC	ACG	GTC	AGA	GTG	TGG	GAT	1068
Arg	Val	Ile	Ile	Thr	Gly	Ser	Ser	Asp	Ser	Thr	Val	Arg	Val	Trp	Asp	
	320						325					330				

GTA AAT ACA GGT GAA ATG CTA AAC ACG TTG ATT CAC CAT TGT GAA GCA Val Asn Thr Gly Glu Met Leu Asn Thr Leu Ile His His Cys Glu Ala 335 340 345	1116
GTT CTG CAC TTG CGT TTC AAT AAT GGC ATG ATG GTG ACC TGC TCC AAA Val Leu His Leu Arg Phe Asn Asn Gly Met Met Val Thr Cys Ser Lys 350 355 360 365	1164
GAT CGT TCC ATT GCT GTA TGG GAT ATG GCC TCC CCA ACT GAC ATT ACC Asp Arg Ser Ile Ala Val Trp Asp Met Ala Ser Pro Thr Asp Ile Thr 370 375 380	1212
CTC CGG AGG GTG CTG GTC GGA CAC CGA GCT GCT GTC AAT GTT GTA GAC Leu Arg Arg Val Leu Val Gly His Arg Ala Ala Val Asn Val Val Asp 385 390 395	1260
TTT GAT GAC AAG TAC ATT GTT TCT GCA TCT GGG GAT AGA ACT ATA AAG Phe Asp Asp Lys Tyr Ile Val Ser Ala Ser Gly Asp Arg Thr Ile Lys 400 405 410	1308
GTA TGG AAC ACA AGT ACT TGT GAA TTT GTA AGG ACC TTA AAT GGA CAC Val Trp Asn Thr Ser Thr Cys Glu Phe Val Arg Thr Leu Asn Gly His 415 420 425	1356
AAA CGA GGC ATT GCC TGT TTG CAG TAC AGG GAC AGG CTG GTA GTG AGT Lys Arg Gly Ile Ala Cys Leu Gln Tyr Arg Asp Arg Leu Val Val Ser 430 435 440 445	1404
GGC TCA TCT GAC AAC ACT ATC AGA TTA TGG GAC ATA GAA TGT GGT GCA Gly Ser Ser Asp Asn Thr Ile Arg Leu Trp Asp Ile Glu Cys Gly Ala 450 455 460	1452
TGT TTA CGA GTG TTA GAA GGC CAT GAG GAA TTG GTG CGT TGT ATT CGA Cys Leu Arg Val Leu Glu Gly His Glu Glu Leu Val Arg Cys Ile Arg 465 470 475	1500
TTT GAT AAC AAG AGG ATA GTC AGT GGG GCC TAT GAT GGA AAA ATT AAA Phe Asp Asn Lys Arg Ile Val Ser Gly Ala Tyr Asp Gly Lys Ile Lys 480 485 490	1548
GTG TGG GAT CTT GTG GCT GCT TTG GAC CCC CGT GCT CCT GCA GGG ACA Val Trp Asp Leu Val Ala Ala Leu Asp Pro Arg Ala Pro Ala Gly Thr 495 500 505	1596
CTC TGT CTA CGG ACC CTT GTG GAG CAT TCC GGA AGA GTT TTT CGA CTA Leu Cys Leu Arg Thr Leu Val Glu His Ser Gly Arg Val Phe Arg Leu 510 515 520 525	1644
CAG TTT GAT GAA TTC CAG ATT GTC AGT AGT TCA CAT GAT GAC ACA ATC Gln Phe Asp Glu Phe Gln Ile Val Ser Ser Ser His Asp Asp Thr Ile 530 535 540	1692
CTC ATC TGG GAC TTC CTA AAT GAT CCA GCT GCC CAA GCT GAA CCC CCC Leu Ile Trp Asp Phe Leu Asn Asp Pro Ala Ala Gln Ala Glu Pro Pro 545 550 555	1740
CGT TCC CCT TCT CGA ACA TAC ACC TAC ATC TCC AGA TAAATAACCA Arg Ser Pro Ser Arg Thr Tyr Thr Tyr Ile Ser Arg 560 565	1786
TACACTGACC TCATACTTGC CCAGGACCCA TTAAAGTTGC GGTATTTAAC GTATCTGCCA	1846
ATACCAGGAT GAGCAACAAC AGTAACAATC AAACACTACTGC CCAGTTTCCC TGGACTAGCC	1906

GAGGAGCAGG GCTTTGAGAC TCCTGTTGGG ACACAGTTGG TCTGCAGTCG GCCCAGGACG	1966
GTCTACTCAG CACAACGTGAC TGCTTCAGTG CTGCTATCAG AAGATGTCTT CTATCAATTG	2026
TGAATGATTG GAACTTTTAA ACCTCCCCCTC CTCTCCTCCT TTCACCTCTG CACCTAGTTT	2086
TTTCCCATTG GTTCCAGACA AAGGTGACTT ATAAATATAT TTAGTGTTTT GCCAGAAAAA	2146
AAAAA	2151

(2) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 2:

(i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:

- (A) LONGUEUR: 569 acides aminés
- (B) TYPE: acide aminé
- (D) CONFIGURATION: linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE: protéine

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO: 2:

Met	Asp	Pro	Ala	Glu	Ala	Val	Leu	Gln	Glu	Lys	Ala	Leu	Lys	Phe	Met	1	5	10	15
Asn	Ser	Ser	Glu	Arg	Glu	Asp	Cys	Asn	Asn	Gly	Glu	Pro	Pro	Arg	Lys	20	25	30	
Ile	Ile	Pro	Glu	Lys	Asn	Ser	Leu	Arg	Gln	Thr	Tyr	Asn	Ser	Cys	Ala	35	40	45	
Arg	Leu	Cys	Leu	Asn	Gln	Glu	Thr	Val	Cys	Leu	Ala	Ser	Thr	Ala	Met	50	55	60	
Lys	Thr	Glu	Asn	Cys	Val	Ala	Lys	Thr	Lys	Leu	Ala	Asn	Gly	Thr	Ser	65	70	75	80
Ser	Met	Ile	Val	Pro	Lys	Gln	Arg	Lys	Leu	Ser	Ala	Ser	Tyr	Glu	Lys	85	90	95	
Glu	Lys	Glu	Leu	Cys	Val	Lys	Tyr	Phe	Glu	Gln	Trp	Ser	Glu	Ser	Asp	100	105	110	
Gln	Val	Glu	Phe	Val	Glu	His	Leu	Ile	Ser	Gln	Met	Cys	His	Tyr	Gln	115	120	125	
His	Gly	His	Ile	Asn	Ser	Tyr	Leu	Lys	Pro	Met	Leu	Gln	Arg	Asp	Phe	130	135	140	
Ile	Thr	Ala	Leu	Pro	Ala	Arg	Gly	Leu	Asp	His	Ile	Ala	Glu	Asn	Ile	145	150	155	160
Leu	Ser	Tyr	Leu	Asp	Ala	Lys	Ser	Leu	Cys	Ala	Ala	Glu	Leu	Val	Cys	165	170	175	
Lys	Glu	Trp	Tyr	Arg	Val	Thr	Ser	Asp	Gly	Met	Leu	Trp	Lys	Lys	Leu	180	185	190	
Ile	Glu	Arg	Met	Val	Arg	Thr	Asp	Ser	Leu	Trp	Arg	Gly	Leu	Ala	Glu	195	200	205	
Arg	Arg	Gly	Trp	Gly	Gln	Tyr	Leu	Phe	Lys	Asn	Lys	Pro	Pro	Asp	Gly	210	215	220	

Asn Ala Pro Pro Asn Ser Phe Tyr Arg Ala Leu Tyr Pro Lys Ile Ile
 225 230 235 240
 Gln Asp Ile Glu Thr Ile Glu Ser Asn Trp Arg Cys Gly Arg His Ser
 245 250 255
 Leu Gln Arg Ile His Cys Arg Ser Glu Thr Ser Lys Gly Val Tyr Cys
 260 265 270
 Leu Gln Tyr Asp Asp Gln Lys Ile Val Ser Gly Leu Arg Asp Asn Thr
 275 280 285
 Ile Lys Ile Trp Asp Lys Asn Thr Leu Glu Cys Lys Arg Ile Leu Thr
 290 295 300
 Gly His Thr Gly Ser Val Leu Cys Leu Gln Tyr Asp Glu Arg Val Ile
 305 310 315 320
 Ile Thr Gly Ser Ser Asp Ser Thr Val Arg Val Trp Asp Val Asn Thr
 325 330 335
 Gly Glu Met Leu Asn Thr Leu Ile His His Cys Glu Ala Val Leu His
 340 345 350
 Leu Arg Phe Asn Asn Gly Met Met Val Thr Cys Ser Lys Asp Arg Ser
 355 360 365
 Ile Ala Val Trp Asp Met Ala Ser Pro Thr Asp Ile Thr Leu Arg Arg
 370 375 380
 Val Leu Val Gly His Arg Ala Ala Val Asn Val Val Asp Phe Asp Asp
 385 390 395 400
 Lys Tyr Ile Val Ser Ala Ser Gly Asp Arg Thr Ile Lys Val Trp Asn
 405 410 415
 Thr Ser Thr Cys Glu Phe Val Arg Thr Leu Asn Gly His Lys Arg Gly
 420 425 430
 Ile Ala Cys Leu Gln Tyr Arg Asp Arg Leu Val Val Ser Gly Ser Ser
 435 440 445
 Asp Asn Thr Ile Arg Leu Trp Asp Ile Glu Cys Gly Ala Cys Leu Arg
 450 455 460
 Val Leu Glu Gly His Glu Glu Leu Val Arg Cys Ile Arg Phe Asp Asn
 465 470 475 480
 Lys Arg Ile Val Ser Gly Ala Tyr Asp Gly Lys Ile Lys Val Trp Asp
 485 490 495
 Leu Val Ala Ala Leu Asp Pro Arg Ala Pro Ala Gly Thr Leu Cys Leu
 500 505 510
 Arg Thr Leu Val Glu His Ser Gly Arg Val Phe Arg Leu Gln Phe Asp
 515 520 525
 Glu Phe Gln Ile Val Ser Ser Ser His Asp Asp Thr Ile Leu Ile Trp
 530 535 540
 Asp Phe Leu Asn Asp Pro Ala Ala Gln Ala Glu Pro Pro Arg Ser Pro
 545 550 555 560
 Ser Arg Thr Tyr Thr Tyr Ile Ser Arg
 565

(2) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 3:

- (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:
 - (A) LONGUEUR: 19 paires de bases
 - (B) TYPE: nucléotide
 - (C) NOMBRE DE BRINS: simple
 - (D) CONFIGURATION: linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE: ADNc

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO: 3:

CCAAACTGCG TATAACGCG

19

(2) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 4:

- (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:
 - (A) LONGUEUR: 20 paires de bases
 - (B) TYPE: nucléotide
 - (C) NOMBRE DE BRINS: simple
 - (D) CONFIGURATION: linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE: ADNc

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO: 4:

GGTGAATCAA CGTGTTTAGC

20

(2) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 5:

- (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:
 - (A) LONGUEUR: 20 paires de bases
 - (B) TYPE: nucléotide
 - (C) NOMBRE DE BRINS: simple
 - (D) CONFIGURATION: linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE: ADNc

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO: 5:

GGATGATGTA TATAACTATC

20

(2) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 6:

- (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:
 - (A) LONGUEUR: 25 paires de bases
 - (B) TYPE: nucléotide
 - (C) NOMBRE DE BRINS: simple
 - (D) CONFIGURATION: linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE: ADNc

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO: 6:

TTTATCCAG ATCTTGATTG TGTTG

25

(2) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 7:

- (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:
 - (A) LONGUEUR: 30 paires de bases
 - (B) TYPE: nucléotide
 - (C) NOMBRE DE BRINS: simple
 - (D) CONFIGURATION: linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE: ADNc

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO: 7:

CCAGGATCCT TATACAACAT TGACAGCAGC

30

(2) INFORMATIONS POUR LA SEQ ID NO: 8:

- (i) CARACTERISTIQUES DE LA SEQUENCE:
 - (A) LONGUEUR: 29 paires de bases
 - (B) TYPE: nucléotide
 - (C) NOMBRE DE BRINS: simple
 - (D) CONFIGURATION: linéaire

(ii) TYPE DE MOLECULE: ADNc

(xi) DESCRIPTION DE LA SEQUENCE: SEQ ID NO: 8:

CCAGGATCCT TAGTCCCAGA TGAGGATTG

29

REVENDICATIONS

1. Protéine humaine β TrCP (h- β TrCP) de ciblage des protéines vers les voies de dégradation par le protéasome, caractérisée en ce qu'elle a la
5 SEQ ID No.2.

2. Protéine selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle est capable d'interagir avec les protéines susceptibles d'être dégradées par le protéasome, notamment celles qui possèdent le motif de phosphorylation comprenant les acides aminés Asp-Ser-Glu-Xaa-Xaa-Ser dans lequel Xaa est un acide aminé
10 naturel quelconque et dans lequel les résidus sérine sont phosphorylés.

3. Protéine selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce qu'elle est capable d'interagir avec la protéine Vpu du virus HIV-I ou avec les protéines cellulaires $\text{I}\kappa\beta$ ou β -caténine.

4. Protéine selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle est capable
15 d'interagir avec la protéine Skp1p.

5. Protéine selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce qu'elle comporte les motifs ci-après :

- boîte F : acides aminés 147-191,
- premier motif WD : acides aminés 259-292,
- 20 - deuxième motif WD : acides aminés 304-332,
- troisième motif WD : acides aminés 343-372,
- quatrième motif WD : acides aminés 387-415,
- cinquième motif WD : acides aminés 427-455,
- sixième motif WD : acides aminés 467-492,
- 25 - septième motif WD : acides aminés 516-544.

6. Fragments peptidiques de la protéine selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 résultant de l'addition, la suppression et/ou le remplacement d'un ou plusieurs acides aminés, lesdits fragments peptidiques ayant conservé l'activité d'interaction avec la protéine Vpu du virus HIV-1, la protéine cellulaire
30 $\text{I}\kappa\text{B}$ ou la protéine cellulaire β -caténine et/ou avec la protéine Skp1p.

7. Séquences d'acides nucléiques codant pour la protéine humaine h-βTrcp et les fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisées en ce qu'elles sont constituées par :

- 5 a) la séquence d'ADN SEQ ID No.1 et des fragments d'acides nucléiques codant pour lesdits fragments peptidiques ;
- b) les séquences d'ADN hybridant dans des conditions strictes avec les séquences ci-dessus ou un de ses fragments ;
- c) les séquences d'ADN qui, en raison de la dégénérescence du code génétique, résultent des séquences a) et b) ci-dessus et codent pour la protéine humaine
- 10 h-βTrcp ou les fragments de celle-ci ; et
- d) les séquences d'ARNm et d'ADN correspondantes.

8. Utilisation de la protéine h-βTrCP ou des fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour le criblage d'agents antiviraux anti-HIV-1 susceptibles d'inhiber l'interaction entre la protéine h-βTrCP et la

15 protéine Vpu.

9. Utilisation de la protéine h-βTrCP ou des fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour le criblage d'agents antiviraux anti-HIV-1 susceptibles d'inhiber l'interaction entre la protéine h-βTrCP et la protéine Skp1p.

20 10. Utilisation des séquences d'acides nucléiques selon la revendication 7 pour le criblage d'agents antiviraux anti-HIV susceptibles d'inhiber l'interaction entre la protéine h-βTrCP et la protéine Vpu.

11. Utilisation des séquences d'acides nucléiques selon la revendication 7 pour le criblage d'agents antiviraux anti-HIV susceptibles d'inhiber l'interaction

25 entre la protéine h-βTrCP et la protéine Skp1p.

12. Utilisation de la protéine h-βTrCP ou des fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour le criblage d'agents antitumoraux capables de perturber la régulation du cycle cellulaire ou des processus de dégradation des protéines dans des cellules humaines tumorales par modulation de

30 l'interaction entre la protéine h-βTrCP et la protéine Skp1p.

13. Utilisation des séquences d'acides nucléiques selon la revendication 7, pour le criblage d'agents antitumoraux capables de perturber la régulation du cycle cellulaire ou des processus de dégradation des protéines dans des cellules humaines tumorales par modulation de l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine Skp1p.

14. Utilisation de la protéine h- β TrCP ou des fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour le criblage d'agents anti-inflammatoires capables de perturber l'activation du facteur de transcription NF κ B par inhibition de l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine I κ B.

15. Utilisation des séquences d'acides nucléiques selon la revendication 7 pour le criblage d'agents anti-inflammatoires capables de perturber l'activation du facteur de transcription NF κ B par inhibition de l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine I κ B.

16. Utilisation de la protéine h- β TrCP ou des fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour le criblage d'agents antitumoraux susceptibles de réactiver l'interaction entre la protéine h- β TrCP et une protéine β - caténine mutée de cellules tumorales, ou entre la h- β TrCP et la β - caténine normale de cellules tumorales dépourvues de la protéine APC.

17. Utilisation des séquences d'acides nucléiques selon la revendication 7 pour le criblage d'agents antitumoraux susceptibles de réactiver l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine β - caténine mutée de cellules tumorales ou entre la h- β TrCP et la β - caténine normale de cellules tumorales dépourvues de la protéine APC.

18. Utilisation de la protéine h- β TrCP ou des fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour le criblage d'agents anti-Alzheimer susceptibles de réduire le taux de dégradation de la β - caténine par inhibition de l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine β - caténine.

19. Utilisation des séquences d'acides nucléiques selon la revendication 7 pour le criblage d'agents anti-Alzheimer susceptibles de réduire le taux de

dégradation de la β - caténine par inhibition de l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine β - caténine.

20. Utilisation de la protéine h- β TrCP ou des fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour la détection par criblage en double-
5 hybride en levure des mutations de la β - caténine.

21. Utilisation des séquences d'acides nucléiques selon la revendication 7 pour la détection par criblage en double-hybride en levure des mutations de la β - caténine.

22. Agents antiviraux anti-HIV qui sont constitués par les fragments
10 peptidiques de la protéine h- β TrCP selon la revendication 4 dénués de la boîte F.

23. Agents antiviraux anti-HIV qui sont constitués par les fragments peptidiques de la protéine h- β TrCP selon la revendication 7 dénués des motifs WD.

24. Anticorps dirigés contre la protéine h- β TrCP ou les fragments
15 peptidiques tels que définis dans l'une quelconque des revendications 1 à 6.

25. Oligonucléotides antisens bloquant la transcription ou la traduction de la protéine h- β TrCP selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 qui s'hybrident avec une séquence d'acides nucléiques selon la revendication 7.

26. Agents antitumoraux qui sont constitués par les fragments peptidiques
20 de la protéine h- β TrCP selon la revendication 7, qui possèdent la boîte F.

27. Agents antitumoraux qui sont consitués par les fragments peptidiques de la protéine h- β TrCP selon la revendication 7 et qui ont conservé à la fois les motifs WD et la boîte F.

28. Agents anti-inflammatoires qui sont constitués par les fragments
25 peptidiques de la protéine h- β TrCP selon la revendication 7 dénués de la boîte F.

29. Animaux transgéniques exprimant un transgène de la protéine h- β TrCP selon l'une quelconque des revendications 1 à 6.

30. Animaux transgéniques dans lesquels le gène β TrCP a été invalidé.

31. Vecteur d'expression, caractérisé en ce qu'il comprend une séquence d'acides nucléiques selon la revendication 7 et les moyens nécessaires à son expression.

5 32. Microorganismes ou cellules hôtes transformés par un vecteur d'expression selon la revendication 31.

33. Microorganismes ou cellules hôtes co-transformés par un vecteur d'expression contenant le gène codant pour la protéine Vpu et un vecteur d'expression selon la revendication 31.

10 34. Microorganismes ou cellules hôtes cotransformés par un vecteur d'expression contenant le gène codant pour la protéine Skp1p et un vecteur d'expression selon la revendication 31.

35. Microorganismes ou cellules hôtes cotransformés par un vecteur d'expression contenant le gène codant pour la protéine I κ B et un vecteur d'expression selon la revendication 31.


15 36. Microorganismes ou cellules hôtes cotransformés par un vecteur d'expression contenant le gène codant pour la protéine β -caténine oncogène et un vecteur d'expression selon la revendication 31.

ABREGE DESCRIPTIF


La présente invention concerne la protéine humaine β -TrCP de ciblage des protéines vers les voies de dégradation par le protéasome qui est capable d'interagir avec la protéine Vpu du virus HIV-1, avec les protéines cellulaires I κ B et β -caténine et avec la protéine cellulaire Skp1p, ainsi que ses fragments peptidiques et les séquences d'acides nucléiques codant pour ladite protéine et ses fragments.

Elle concerne également l'utilisation de la protéine humaine β -TrCP ou de ses fragments peptidiques pour le criblage d'agents antiviraux anti-HIV-1, et d'agents antitumoraux et d'agents anti-inflammatoires, les agents antiviraux, les agents antitumoraux, les agents anti-inflammatoires et les anticorps dirigés contre ladite protéine et ses fragments peptidiques.

A



B



C




Figure 1

*****	*****		
MDPAEAVLQEKALKFMN-----	SSERE	CNNGEPPRKI	33
MEGFSCSLQPPT-----	ASERE	CNRDEPPRKI	28
MRRERQRMMSFEDKDKDDLDNSNSNNSSEMTDTAMMPLKRLITGSSDLAQSSGKKK			60
MSSVLMSKTVTPFLREHIPSIIYAPIGKPGNQETARAENPN-----			40
*****	*****		
IPKNSLRQTYNSCARLCLNQETVCLASTAMKTENCVAKTKLANGTSSMIVPKOR----			88
ITE-----	KNTLRQTKLANGTSSMIVPKOR----		53
LTMATRSPSSSPDLATNDSGRVQPLPEYNFTKFCYRHNPDIOFSPHTACYKODLKRTQ			120
-----	SKCYRHHPD-----	SKCRRADKAKMV	63
-----	KLSSASYEKEKELCVKYFEQWSESDQVEFEVHLISOMCH		126
-----	KLSSANYEREKELCVKYFEQWSECDQVEFEVHLISRMCH		91
EINANIAKLPLQEQSDIHIIISKYSNSNDKIRKILDGILSTCFPOLSYISSLVTHM--			178
MIQSELDKLTADQOAVTHVWSLFSAPARHRDLMLQGLSLQCFPOLSEVSREVNEA--			121
	F-BOX		
YQGHGINSYLKPMQLQDFITALPARGLDHIAENILSYLDAKSLCAELVCKEYRVTS DG			186
YQGHGINTYLKPMQLQDFITALPARGLDHIAENILSYLDAKSLCSAELVCKEYRVTS DG			151
-----	IKIDFISILPQE-----	LSLKILSYLDCQSLCNATRVCKRWOKLADD	221
-----	LKIDFISALPVE-----	LAQKVLCLYDVTSLTKAAQVSQRTLADSD	164
*****	*****		
MLWKKLIERMVRTDSLWRGLAERRGNGOYLFFKNKPPDGNAPPNSFYRALYPKIIQDIET-			245
MLWKKLIERMVRTDSLWRGLAERRGNGOYLFFKNKPPDGTTPNSFYRALYPKIIQDIET-			210
RVVYHMCQOHI-----	DRKCPNCGWGLPLLHMK--	RARIQONSTGSSSNADIQTOT--	270
AVVVRMCQOHV-----	NRKCTKCGWGLPLLRLERKKLRNYTRQRLAKGGPQGRVTELADS		218
-----	-----	IES	248
-----	-----	IES	213
-----	-----	TRPWKVIYRERFKVES	286
HDSQDRSVNQHGKRPAAEAEEEDPIKKRQCMAAAEASKAVTQPKTRSWKAVYRDRWQVSY			278
	WD-1		
NWRCGRHSLORIHCRSETSKGVYCLQYDDQKIVSGLRDNITIKIWDKNTLECKRILTGHTG			308
NWRCGRHSLORIHCRSETSKGVYCLQYDDQKIVSGLRDNITIKIWDKNTLECKRVLMGHTG			273
NWRCGRHSLORIHCRSETSKGVYCLQYDDQKIVSGLRDNITIKIWDKNTLECKRVLMGHTG			343
NWRCGRHSLORIHCRSETSKGVYCLQYDDQKIVSGLRDNITIKIWDKNTLECKRVLMGHTG			335
	WD-2		
SVLCLQYDERVITGSSDSTVRVWDVNTGEMNTLIHHCEAVLHLRNNNGMMVTCSKDRS			368
SVLCLQYDERVITGSSDSTVRVWDVNTGEMNTLIHHCEAVLHLRNNNGMMVTCSKDRS			333
GVKTLFYFDDRKLTITGSLDKTIRVWNYITGECISTYRGHSDSVLSVDSYQKVIVSGSADKT			403
GIRALQFDDSKLISGSLDHTIKVWVWHTGECISTFAAHTDSVLISVHSDGHLLASGSSDKT			395
	WD-3		
IADVMDASPTDITLRRVLVGHRAAVNVVDFDDKYIVSASGDRITKVVNTSTCEFVRLN-			427
IADVMDASPTDITLRRVLVGHRAAVNVVDFDDKYIVSASGDRITKVVNTSTCEFVRLN-			392
VKVMHVESRHCYILRGHTEWVNCVK--	LHPKSFSCFSCSDDTITRMWDIRTNCLKVFRG		461
VKIFDFNSKETYCLKGHSWVNSTH--	VDIKSRTVFSASDDITIKLWDLDTROVIRTYEG		453
-----	-----		427
HVGQVQKIIPLTIKDVE-----	-----	NLATDNTSDG	392
HVGHVQVQLILPPEYEPDEEVLNGASQDNQDAMSVSSGGSGSPMSHAQIERAGSPGSHS			488
-----	-----		513
	WD-5		
-----	GHKRGIACLOVRDLVVGSSDNTIRLWDIECGACL RV		465
-----	GHKRGIACLOVRDLVVGSSDNTIRLWDIECGACL RV		430
SSPQDDPTMTDGADES DTPSNEQETVLDENIPYPTH--	LLSCGLDNTIKLWDVKTGKCI RT		547
SSHNLLPSSLPBGDEVRHLYGSAFVADESRLPPRYFMTGGLDSTMLRWD SATGRCLRT			573
	WD-6		
LEGHEELVRCIRFONKRIVSGAYDGKIKVWDLVAALDPRAPAGTLCRLTLVEHSGRVFRL			525
LEGHEELVRCIRFONKRIVSGAYDGKIKVWDLVAALDPRAPAGTLCRLTLVEHSGRVFRL			490
QFGHVEGVWDIAADNFRITSGSHDGSIKVWDLQSGKCMHTFNRRLORETQHTQTQSLGD			607
LEGHEELVRCIRFONKRIVSGAYDGKIKVWDLVAALDPRAPAGTLCRLTLVEHSGRVFRL			619
	WD-7		
QFDEFQIVSSSHDDTILIWDFLNDPAAQAEPPRSPSRTYTYISR●	569	h-βTrCP	
QFDEFQIVSSSHDDTILIWDFLNDPGLA●	518	x-βTrCP1	
KVAPIACVCIGDSECFSGDESGCVKMYKFDLND●	640	MET30	
---PVTCVGLSDSLMASGSEDGTIRLHSFKPCRQ●	650	SCON2	



Figure 3













	LexA-hybride	Gal4AD-hybride	+His	-His	β -gal	β -Gal unités
1	Skp1p	+ h- β TrCP				18
2	Skp1p	+ h- β TrCP- Δ 7W				124
3	Skp1p	+ VBP1				2
4	Skp1p	+ CD4c				2

Figure 4

Compartiment luminal




Figure 5




Figure 6




Figure 7




Figure 8




Figure 9




Figure 10




Figure 11
 plasmides rapporteurs : en gris, TOP-tk-Luci ; en blanc, FOP-tk-Luci




Figure 12

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

REC'D 27 JUN 2000

WIPO

PCT

17 T



Référence du dossier du déposant ou du mandataire H50765C38VT	POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)	
Demande internationale n° PCT/FR99/00196	Date du dépôt international (jour/mois/année) 29/01/1999	Date de priorité (jour/mois/année) 30/01/1998
Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB C12N15/12		
Déposant INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA R. ..et al.		

1. Le présent rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est transmis au déposant conformément à l'article 36.
2. Ce RAPPORT comprend 7 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.
 - ☒ Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).

Ces annexes comprennent 5 feuilles.

3. Le présent rapport contient des indications relatives aux points suivants:

- I ☒ Base du rapport
- II ☐ Priorité
- III ☐ Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle
- IV ☐ Absence d'unité de l'invention
- V ☒ Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- VI ☒ Certains documents cités
- VII ☐ Irrégularités dans la demande internationale
- VIII ☒ Observations relatives à la demande internationale

Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale 10/08/1999	Date d'achèvement du présent rapport 29.06.00
Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international:  Office européen des brevets D-80298 Munich Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Fonctionnaire autorisé Chavanne, F N° de téléphone +49 89 2399 8399 

**RAPPORT D'EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n° PCT/FR99/00196

I. Base du rapport

1. Ce rapport a été rédigé sur la base des éléments ci-après (*les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans le présent rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications.*) :

Description, pages:

1-37 version initiale

Revendications, N°:

1-36 reçue(s) avec télécopie du 26/04/2000

Dessins, feuilles:

1/12-12/12 version initiale

2. Les modifications ont entraîné l'annulation :

- ☐ de la description, pages :
- ☐ des revendications, n°s :
- ☐ des dessins, feuilles :

3. ☐ Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle 70.2(c)) :

4. Observations complémentaires, le cas échéant :

**RAPPORT D'EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n° PCT/FR99/00196

V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté	Oui : Revendications 1-36
	Non : Revendications
Activité inventive	Oui : Revendications
	Non : Revendications 1-36
Possibilité d'application industrielle	Oui : Revendications 1-36
	Non : Revendications

2. Citations et explications

voir feuille séparée

VI. Certain documents cités

1. Certains documents publiés (règle 70.10)

et / ou

2. Divulgations non écrites (règle 70.9)

voir feuille séparée

VIII. Observations relatives à la demande internationale

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarté des revendications, de la description et des dessins et de la question de savoir si les revendications se fondent entièrement sur la description :

voir feuille séparée

V. Déclaration motivée selon la règle 66.2(a)(ii) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. L'examen de la présente demande a été réalisé en assumant que la priorité revendiquée est valide. S'il devait se révéler que tel n'est pas le cas, des documents intermédiaires deviendraient alors pertinent pour juger de la brevetabilité de l'objet de la présente demande.
2. Il est fait référence aux documents suivants:

D1: Nature
Vol. 391, page 493-496, 1998
D2: Cell
Vol. 86, pages 263-274, 1996
3. L'objet des revendications 1-36 n'est pas décrit de manière spécifique dans l'art antérieur. Par conséquent, ces revendications peuvent être considérées comme nouvelles.
4. Le document D1 est considéré comme l'état de la technique le plus proche des revendications 1-3, 5-7, 29-32 et 36.
Le problème technique que se propose de résoudre la présente demande peut être énoncé comme étant de mettre à disposition un moyen de modulation du ciblage des protéines vers le protéasome. La présente demande se propose de résoudre le problème posé par la mise à disposition de la protéine humaine de BTrCP.
Le document D1 diffère de l'objet des revendications 1-3, 5-7, 31, 32 et 36 en ce que l'implication de l'équivalent humain de la Slimb, protéine BTrCP de la drosophile, dans la dégradation protéolytique de la β -caténine, n'est que suggérée dans D1 (page 496, paragraphe 2). De plus, il est connu dans l'état de la technique que la protéine de type BTrCP de la drosophile, la protéine Slimb, et la protéine BTrCP de Xenope ont une très haute homologie, ce qui soutient la conservation de la fonction chez ces protéines homologues (voir notamment description page 1, ligne 23 à page 2, ligne 13; D1, page 496, paragraphe 2).

D1 mentionne également la possible implication de la protéine β TrCP dans la suppression tumorale (page 496, paragraphe 2).

En prenant en compte le problème à résoudre, l'homme du métier, au vu de D1, testerait l'implication de la protéine humaine β TrCP dans le ciblage de la β -caténine vers le protéasome. L'isolation de la protéine β TrCP humaine ne nécessite la mise en oeuvre d'aucune activité inventive. Du fait de la très haute conservation de séquence de la protéine β TrCP entre les différentes espèces, par la mise en oeuvre des techniques connues d'hybridation notamment, l'homme du métier isolerait automatiquement un clone d'ADNc codant pour la β TrCP humaine de SEQ ID NO:2. Par la simple application de techniques couramment utilisées, l'homme du métier arriverait donc sans nécessiter la mise en oeuvre d'activité inventive à l'objet des revendications 1-3, 5-7, 29-32 et 36. Dans ce contexte, il est à noter que la référence à des protéines introduite par l'expression "notamment" (revendication 2) est introduite à titre d'exemple indicatif et en aucun cas exhaustif, et ne peut donc être considéré comme limitant l'objet de la revendication concernée. Les revendications 1-3, 5-7, 29-32 et 36 ne sont donc pas inventives.

L'activité de la β -caténine, l'action de son accumulation dans les cellules ou de la diminution de son niveau dans les cellules neuronales, notamment, son connues dans l'état de la technique (voir notamment description, page 5, lignes 3-24). Par l'application plus en avant de ses connaissances et la mise en oeuvre de techniques couramment utilisées, l'homme du métier arriverait également à l'objet des revendications 16-21 et 24-27. Ces revendications ne sont donc pas inventives.

Le document D2 peut être considéré comme l'état de la technique le plus proche des revendications 4, 6, 24 et 34. D2 se différencie de l'objet de ces revendications par le fait que l'interaction de la β TrCP avec la protéine Skp1p n'y est que suggérée.

D2 montre que la protéine Skp1p est nécessaire pour la protéolyse médiée par l'ubiquitine. Le motif Boîte F, présent dans la protéine β TrCP, est indispensable pour l'interaction avec Skp1p et le ciblage des protéines vers le protéasome (voir notamment résumé; figure 4A et 4B). De plus, D2 montre l'activité de la Skp1p au niveau du contrôle du cycle cellulaire, mettant en évidence son action dans la prolifération cellulaire (page 266, colonne 2; page 271, colonne 2 à page 272, colonne 1).

Par conséquent, au vu de D2, et en le combinant avec D1, l'homme du métier arriverait à l'objet des revendications 4, 6, 22, 24 et 34. De plus, de part la relation mise en évidence dans D2 de l'activité de la protéine Skp1p au niveau du contrôle du cycle cellulaire, l'homme du métier, par la simple mise en application de ses connaissances arriverait également à l'objet des revendications 9, 11-13 et 25-27. Les revendications 4, 6, 9, 11-13, 22, 24-27 et 34 ne sont donc pas inventives. La dépendance de la protéine Vpu de la présence d'une machinerie d'ubiquitination intacte pour sa médiation de la dégradation du récepteur CD4, ainsi que l'activité de la protéine I κ B comme inhibiteur du facteur de transcription NF κ B et son ciblage vers les voies de dégradation du protéasome sont connus dans l'état de la technique (voir notamment, description, page 3; page 4, lignes 23-30). Par conséquent, au vu des enseignements précédemment cités et des relations connues dans l'état de la technique entre protéines Vpu et I κ B et protéasome, il aurait été évident pour l'homme du métier de tester l'interaction de la protéine humaine β TrCP avec également la protéine Vpu et la protéine I κ B, et ainsi de parvenir à l'objet des revendications 8, 10, 14, 15, 22, 23, 28, 33 et 35. Ces revendications ne sont donc pas inventives. Par conséquent, les revendications 1-36 ne remplissent pas les conditions de l'Article 33(3) PCT.

VI. Certains documents cités

Certains documents publiés (règle 70.10)

1. Trends in Genetics
Vol. 14, No. 6, pp. 236-243, 1998
2. Molecular Cell
Vol. 1, No. 4, pp. 565-574, 1998
3. Nature
Vol. 396, No. 6711, pp. 590-594, 1998
4. Oncogene
Vol. 18, No. 4, pp. 849-854, 1999
5. Molecular Biology of the Cell
Vol. 9, No. suppl., page 240A, 1998

VIII. Observations relatives à la demande internationale

1. L'objet des revendications 2-4 pour lequel protection est recherchée (une protéine) n'est pas clairement défini, du fait que celui-ci n'est pas défini par des caractéristiques techniques. En effet, ces revendications sont énoncées de telle manière que leur objet n'est défini que par le résultat à obtenir ("est capable de..."). Une telle définition n'est admissible que dans les conditions prévues par les Directives C-III, 4.7 PCT. Les formulations ici utilisées ne sont cependant pas acceptables parce qu'il est possible de définir l'objet revendiqué dans des termes plus concrets, c'est à dire par la manière dont le résultat peut être atteint. Les revendications 2-4 ne remplissent donc pas les conditions de l'Article 6 PCT.
2. L'étendue des revendications 32-36 inclue un hôte humain et devrait donc être limitée en conséquence.

26-04-2000

FR 009900196

REVENDICATIONS

1. Protéine humaine β TrCP (h- β TrCP) de ciblage des protéines vers les voies de dégradation par le protéasome, caractérisée en ce qu'elle a la
5 SEQ ID No.2.

2. Protéine selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle possède des motifs WD et en ce qu'elle est capable d'interagir avec les protéines susceptibles d'être dégradées par le protéasome, notamment celles qui possèdent le motif de phosphorylation comprenant les acides aminés Asp-Ser-Glu-Xaa-Xaa-Ser dans
10 lequel Xaa est un acide aminé naturel quelconque et dans lequel les résidus sérine sont phosphorylés.

3. Protéine selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce qu'elle possède des motifs WD et en ce qu'elle est capable d'interagir avec la protéine Vpu du virus HIV-1 ou avec les protéines cellulaires I κ B ou β -caténine.

15 4. Protéine selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle possède une boîte F et en ce qu'elle est capable d'interagir avec la protéine Skp1p.

5. Protéine selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce qu'elle comporte les motifs ci-après :

- boîte F : acides aminés 147-191,
- 20 - premier motif WD : acides aminés 259-292,
- deuxième motif WD : acides aminés 304-332,
- troisième motif WD : acides aminés 343-372,
- quatrième motif WD : acides aminés 387-415,
- cinquième motif WD : acides aminés 427-455,
- 25 - sixième motif WD : acides aminés 467-492,
- septième motif WD : acides aminés 516-544.

6. Fragments peptidiques de la protéine selon l'une quelconque des revendications 1 à 5 résultant de l'addition, la suppression et/ou le remplacement d'un ou plusieurs acides aminés, lesdits fragments peptidiques ayant conservé
30 l'activité d'interaction avec la protéine Vpu du virus HIV-1, la protéine cellulaire I κ B ou la protéine cellulaire β -caténine et/ou avec la protéine Skp1p.

26-04-2000

FR 009900196

7. Séquences d'acides nucléiques codant pour la protéine humaine h-βTrCP et les fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisées en ce qu'elles sont constituées par :

- a) la séquence d'ADN SEQ ID No.1 et des fragments d'acides nucléiques codant pour lesdits fragments peptidiques ;
- b) les séquences d'ADN hybridant dans des conditions strictes avec les séquences ci-dessus ou un de ses fragments ;
- c) les séquences d'ADN qui, en raison de la dégénérescence du code génétique, résultent des séquences a) et b) ci-dessus et codent pour la protéine humaine h-βTrCP ou les fragments de celle-ci ; et
- d) les séquences d'ARNm et d'ADN correspondantes.

8. Utilisation de la protéine h-βTrCP ou des fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour le criblage d'agents antiviraux anti-HIV-1 susceptibles d'inhiber l'interaction entre la protéine h-βTrCP et la protéine Vpu.

9. Utilisation de la protéine h-βTrCP ou des fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour le criblage d'agents antiviraux anti-HIV-1 susceptibles d'inhiber l'interaction entre la protéine h-βTrCP et la protéine Skp1p.

10. Utilisation des séquences d'acides nucléiques selon la revendication 7 pour le criblage d'agents antiviraux anti-HIV susceptibles d'inhiber l'interaction entre la protéine h-βTrCP et la protéine Vpu.

11. Utilisation des séquences d'acides nucléiques selon la revendication 7 pour le criblage d'agents antiviraux anti-HIV susceptibles d'inhiber l'interaction entre la protéine h-βTrCP et la protéine Skp1p.

12. Utilisation de la protéine h-βTrCP ou des fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour le criblage d'agents antitumoraux capables de perturber la régulation du cycle cellulaire ou des processus de dégradation des protéines dans des cellules humaines tumorales par modulation de l'interaction entre la protéine h-βTrCP et la protéine Skp1p.

26-04-2000

FR 009900196

13. Utilisation des séquences d'acides nucléiques selon la revendication 7, pour le criblage d'agents antitumoraux capables de perturber la régulation du cycle cellulaire ou des processus de dégradation des protéines dans des cellules humaines tumorales par modulation de l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine Skp1p.

14. Utilisation de la protéine h- β TrCP ou des fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour le criblage d'agents anti-inflammatoires capables de perturber l'activation du facteur de transcription NF κ B par inhibition de l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine I κ B.

15. Utilisation des séquences d'acides nucléiques selon la revendication 7 pour le criblage d'agents anti-inflammatoires capables de perturber l'activation du facteur de transcription NF κ B par inhibition de l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine I κ B.

16. Utilisation de la protéine h- β TrCP ou des fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour le criblage d'agents antitumoraux susceptibles de réactiver l'interaction entre la protéine h- β TrCP et une protéine β -caténine mutée de cellules tumorales, ou entre la h- β TrCP et la β -caténine normale de cellules tumorales dépourvues de la protéine APC.

17. Utilisation des séquences d'acides nucléiques selon la revendication 7 pour le criblage d'agents antitumoraux susceptibles de réactiver l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine β -caténine mutée de cellules tumorales ou entre la h- β TrCP et la β -caténine normale de cellules tumorales dépourvues de la protéine APC.

18. Utilisation de la protéine h- β TrCP ou des fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour le criblage d'agents anti-Alzheimer susceptibles de réduire le taux de dégradation de la β -caténine par inhibition de l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine β -caténine.

19. Utilisation des séquences d'acides nucléiques selon la revendication 7 pour le criblage d'agents anti-Alzheimer susceptibles de réduire le taux de

26-04-2000

FR 009900196

dégradation de la β -caténine par inhibition de l'interaction entre la protéine h- β TrCP et la protéine β -caténine.

20. Utilisation de la protéine h- β TrCP ou des fragments peptidiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 pour la détection par criblage en double-hybride en levure des mutations de la β -caténine.

21. Utilisation des séquences d'acides nucléiques selon la revendication 7 pour la détection par criblage en double-hybride en levure des mutations de la β -caténine.

22. Agents antiviraux anti-HIV qui sont constitués par les fragments peptidiques de la protéine h- β TrCP selon la revendication 4 dénués de la boîte F.

23. Agents antiviraux anti-HIV qui sont constitués par les fragments peptidiques de la protéine h- β TrCP selon la revendication 7 dénués des motifs WD.

24. Anticorps dirigés contre la protéine h- β TrCP ou les fragments peptidiques tels que définis dans l'une quelconque des revendications 1 à 6.

25. Oligonucléotides antisens bloquant la transcription ou la traduction de la protéine h- β TrCP selon l'une quelconque des revendications 1 à 6 qui s'hybrident avec une séquence d'acides nucléiques selon la revendication 7.

26. Agents antitumoraux qui sont constitués par les fragments peptidiques de la protéine h- β TrCP selon la revendication 7, qui possèdent la boîte F.

27. Agents antitumoraux qui sont constitués par les fragments peptidiques de la protéine h- β TrCP selon la revendication 7 et qui ont conservé à la fois les motifs WD et la boîte F.

28. Agents anti-inflammatoires qui sont constitués par les fragments peptidiques de la protéine h- β TrCP selon la revendication 7 dénués de la boîte F.

29. Souris transgéniques exprimant un transgène de la protéine h- β TrCP selon l'une quelconque des revendications 1 à 6.

30. Souris transgéniques dans lesquels le gène β TrCP a été invalidé.

26-04-2000

FR 009900196

31. Vecteur d'expression, caractérisé en ce qu'il comprend une séquence d'acides nucléiques selon la revendication 7 et les moyens nécessaires à son expression.

5 32. Microorganismes ou cellules hôtes transformés par un vecteur d'expression selon la revendication 31.

33. Microorganismes ou cellules hôtes co-transformés par un vecteur d'expression contenant le gène codant pour la protéine Vpu et un vecteur d'expression selon la revendication 31.

10 34. Microorganismes ou cellules hôtes cotransformés par un vecteur d'expression contenant le gène codant pour la protéine Skp1p et un vecteur d'expression selon la revendication 31.

35. Microorganismes ou cellules hôtes cotransformés par un vecteur d'expression contenant le gène codant pour la protéine I κ B et un vecteur d'expression selon la revendication 31.

15 36. Microorganismes ou cellules hôtes cotransformés par un vecteur d'expression contenant le gène codant pour la protéine β -caténine oncogène et un vecteur d'expression selon la revendication 31.